

シャチ 北西太平洋

Killer Whale, *Orcinus orca*



漁業の特徴

本種の捕獲は、かつて小型捕鯨業及びいるか追い込み漁業でさかんに行われていた。小型捕鯨業による捕獲は、主に房総～三陸沖(47.6%)と北海道周辺(36.9%)であり、いるか追い込み漁業による捕獲は、和歌山県太地で行われていた。

管理・関係機関

農林水産省

漁獲の動向

小型捕鯨業による捕獲は、戦後1960年代半ばまでは年間数十頭で推移してきたが、1966年から3年間で年間100頭以上を捕獲して以降、急激に少なくなり、1972年以降は年間多くても数頭程度で推移してきた。1991年からは小型捕鯨業に対する本種の捕獲枠は与えられておらず、事実上捕獲が禁止されている。いるか追い込み漁業による捕獲は、1963年以降合計87頭であり、水族館用の生け捕りも含まれる。現在は、学術調査用の特別捕獲のみ認められており、1997年にこれにより5頭が捕獲されている。

生物学的特性

- 体長・体重(最大): 8.5m・7.5トン(雌)、9.8m・10トン(雄)(体長: 上顎先端～尾鰭分岐点)
- 分布: 北太平洋を含む世界中の広い海域
- 寿命(平均): 雌46歳、雄31歳
- 成熟開始年齢: 雌14.1歳、雄13.0歳
- 繁殖期・繁殖場: 不明・不明
- 索餌期・索餌場: 周年・特に高緯度域が重要と考えられる
- 食性: いか類、硬骨魚類、軟骨魚類、海亀類、海鳥類、アザラシ類、あしか類、鯨類
- 捕食者: さめ(幼獣)

資源状態


北西太平洋(北緯20度以北、東経130～170度の太平洋とオホーツク海)における本種の生息頭数は、1992～1996年、8～9月の目視調査の解析から、北緯40度以北で7,512頭(CV = 0.29)、北緯20～40度で745頭(CV = 0.44)と推定された。また近年、空間分布モデルの手法を用いて、過去24か年分の目視調査データを再解析した結果からは、北太平洋に19,521頭(CV = 0.21)の生息頭数が推定されている。北西太平洋における本種系群の情報は全くないが、米国側の情報から類推すると複数の系群があることは十分予想される。今後系群構造を明らかにして、系群単位の生息頭数とその動向を検討する必要がある。

利用・用途

水族館展示、ホエールウォッチング等

管理方策

現在、学術目的以外での捕獲は禁止されている。



我が国のシャチ捕獲頭数の推移 (1997年は学術目的の特別捕獲)

シャチ(北西太平洋)の資源の現況(要約表)	
資源水準	調査中
資源動向	調査中
世界の捕獲量 (最近5年間)	不明
我が国の捕獲量 (最近5年間)	0頭
管理目標	継続的な個体数モニタリングを実施中
資源評価の方法	ライントランセクト法に基づく目視調査データ解析から資源量を推定する
資源の状態	東経170度以西の北西太平洋のうち、北緯40度以北に7,512頭(CV = 0.29)、北緯20～40度に745頭(CV = 0.44)と推定
管理措置	商業捕獲は禁止、科学調査目的の特別採捕のみ
最新の資源評価年	2007年と2017年 (資源量推定値の報告)
次回の資源評価年	未定