


# キハダ 大西洋

(Yellowfin Tuna *Thunnus albacares*)



## 管理・関係機関

大西洋まぐろ類保存国際委員会 (ICCAT)

## 最近の動き

2020年の総漁獲量は14.9万トン(予備集計)で過去3年平均から9%増加であった。最新の資源評価は2019年7月にICCATにより行われた。最大持続生産量(MSY)は12.1(9.0~26.7)万トンと推定され、2018年の漁獲量より小さい。2018年の資源量はMSYレベルより大きく( $B_{2018}/B_{MSY}=1.17$ (0.75~1.62))、2018年の漁獲率はほぼMSYレベルである( $F_{2018}/F_{MSY}=0.96$ (0.56~1.50))と推定された。したがって、2018年において、本資源は乱獲状態ではなく、本資源への漁獲率は適正なレベルであったといえる。2019年11月のICCAT年次会合で総漁獲可能量(TAC)を引き続き11万トンとすることが合意された。また、従来の人工浮き魚礁(Fish Aggregating Device:FAD)操業の制限(2019年1月1日~2月28日の2か月間、南緯4度、北緯5度、西経20度、アフリカ大陸で囲まれた海域で操業禁止)は強化され、2020年には1~2月の2か月間、さらに2021年には1~3月の3か月間において、大西洋全体におけるFAD操業の禁止が決定された。

## 利用・用途

はえ縄漁獲物は主として刺身、すしに利用される。外国では、缶詰に利用される比率が高い。

## 漁業の概要

大西洋におけるキハダ漁業は1950年頃に始まり、1955年頃から竿釣り及びはえ縄漁業が開始された。日本は1956年に出漁している。当初は、はえ縄の漁獲が多くを占めたが、最近5年間では全漁獲量のうち69%がまき網、12%がはえ縄、6%が竿釣りにより漁獲されていた(図1上)。1990年に漁獲量のピーク(19.4万トン)が記録された後、減少傾向に転じ、2000年代半ば以降横ばいもしくは増加し、2020年には14.9万トン(予備集計)とやや増加した(ICCAT 2021)。

主漁場は熱帯域であり、特に東部大西洋からの漁獲が多い(図2)。1990年から2007年にかけて、スペインやフランスのまき網船が65隻から27隻に減少したこともあり、漁獲量は60%減少(12.8万トンから4.9万トン)した。隻数は減少

したものの、船舶が大型化したため、2010年のまき網漁業全体の魚艙容量は1990年代半ばと同等とみなされた。その後、インド洋操業船(大型の魚艙を装備し、より漁獲効率の良い新造船)が大西洋へ移動してきたため、魚艙容量は2010年に比べてさらに50%増加したとみられている。2013年以降、この元インド洋操業船数が6隻に達したこともあって、まき網の漁獲量は上昇に転じ、2020年には10.5万トンとなった。近年は、素群れ(すむれ)操業よりも、よりFAD操業に依存するようになっている。2011年以降、FAD操業の漁場は拡大し、南は西アフリカ沿岸の南緯15度付近、北はモーリタニア沖合の北緯15度付近まで広がっている。一方、西部大西洋のまき網漁業は、主としてベネズエラ船が担っていたが、2020年の漁獲量はピーク時(1980年代半ば)の12%程度(0.3万トン)となっている。はえ縄は、大西洋のほぼ全域で操業が行われ、2020年は総漁獲量の9%(1.4万トン)を占めた。メキシコ湾





図1. 大西洋におけるキハダの漁法別漁獲量(1950~2020年、上図)と国別漁獲量(1950年~2020年、下図)

で操業する米国船、メキシコ船及びベネズエラ船はキハダを対象としている。日本及び台湾のはえ縄船は、主に熱帯域においてメバチを主対象として操業している。近年の竿釣り船の漁獲量は、東部、西部大西洋ともにピーク時（1990年代）の10～30%程度にまで減少している（ICCAT 2021）。

FAD 操業の進展で、近年のまき網の漁獲物の平均体重は10 kgを下回り、1990年のおおよそ半分にまで減少している。はえ縄の漁獲物の平均体重は、ばらつきが大きく、近年は50 kg程度を推移している。

国別には、以前よりフランスとスペインの漁獲量が多かったが、近年ガーナの比率が高くなっている（図1下、付表1）。2020年はこれら3か国で全体のおおよそ41%を占めた。最近5か年の日本の漁獲量は0.3万～0.4万トン前後で、大きな年変動はみられない。


## 生物学的特性

### 【水平・鉛直分布】

キハダは、三大洋の熱帯域から温帯域にかけて広く分布する（図3）。若齢で小型のキハダは、似たような大きさのカツオやメバチと群れを作ることがあり、これらは主として表層に分布する。成長するにつれて、キハダ単独の群れとなる傾向が強くなり、より深層にも分布するようになる。

### 【繁殖・系群】

産卵は水温24℃以上の水域で周年行われると考えて良いが、季節性もみられ、ギニア湾では12月から翌4月にかけての盛んな産卵行動が知られている。また、海域によって産卵の盛んな時期が異なること（メキシコ湾：盛期5～8月、南カリブ海：盛期7～9月）も知られている（ICCAT 2001）（図4）。このような時期の異なる産卵は、大西洋のキハダに複数の系群が存在



する可能性を示唆する。また、アーカイバルタグ（移動経路等を記録するタイプの標識）による近年の標識放流調査からは、あまり移動せず、ある一定の範囲に留まる傾向がみとれ、複数系群の存在を補強する証拠となり得る。一方で、はえ縄の漁獲状況を見ると、大西洋の東西を通じて、漁獲の切れ目がないことが分かる。また、放流点と再捕点のみが分かるタイプの標識放流調査からは、西部から東部まで大西洋を横断する例が得られている（Ortiz 2001）。また、漁獲サイズには海域によって違いが見られることが知られている（図5）。このように系群の存在についての異なる見解が得られるため、判断が難しいものの、2019年の資源評価の場合も含めて、近年の大西洋キハダの資源評価では、全大西洋で1つの系群と見なしている。

本種の1回当たりの産卵数（Batch fecundity）は、尾叉長132 cmで約120万粒、142 cmで約400万粒と推定されてい

る (Arocha *et al.* 2001)。産卵は夜間にほぼ毎日行われると考えられている (Schaefer 1996)。

【食性・捕食者】

本種の胃中には魚類や甲殻類、頭足類等、幅広い種類の生物がみられる。仔稚魚時代には、魚類に限らず多くの外敵がいるものと思われるが、あまり情報は得られていない。遊泳力がつ

いた後では大型のカジキ類、サメ類、歯鯨類等に外敵は限られるものと思われる。

【成長】

2019年の資源評価では、半数の個体が成熟する尾叉長は115.1 cmとされ (Diaha *et al.* 2015)、自然死亡係数は、Lorenzen (2005)の方法に基づいて年齢別自然死亡係数を推定した。これはベースとなる自然死亡係数 (ターゲット自然死亡係数) を成長曲線に合わせて変化させて推定していく方法で、5歳時の自然死亡係数 (0.35) をベースとした。なお、尾叉長145 cmより大きい場合、大部分が雄であることから、雌の自然死亡率が雄より高い可能性がある。一方、尾叉長120~135 cmでは、雌が優占しており、雌の体長の上限が雄より低い可能性がある。このため、雌雄別の成長と自然死亡率を資源評価で考慮することも検討に値するが、2019年の資源評価では、雌雄で同一の成長式 (表1) と自然死亡係数が用いられた。

成長式

Gascuel *et al.* (1992) :

$$L_t = 37.8 + 8.93t + (137.0 - 8.93t) [1 - \exp(-0.808t)]^{7.49}$$

Draganik and Pelczarski (1984) :

$$L_t = 192.4 \times (1 - \exp(-1 \times 0.37(t + 0.003)))$$

( $L_t$ : ある年齢  $t$  での尾叉長 (cm)、 $t$ : 年齢)

2019年の資源評価で用いられた値は表1に、グラフは図6に示した。これに基づき、50%成熟年齢は3歳となる。

自然死亡係数 (それぞれの成長式に応じた年齢別 (0歳から11歳+) の値) : Gascuel *et al.* (1992)、Draganik and Pelczarski (1984)、2016年及び2019年の資源評価で用いられた値を表2に示した。

体長体重関係式

$$\text{Caverivière } et al. (1976) : W = 2.1527 \times 10^{-5} L^{2.976}$$

( $L$ : 尾叉長 (cm)、 $W$ : 体重 (kg)、 $t$ : 年齢)

最大体長は200 cmを超えるとみられる (FAO FishFinder)。本種の寿命は、年齢査定の結果から、メバチより短く7~10年であろうと考えられていたが、耳石輪紋の解析により18歳と査定される研究例もあり (Andrews *et al.* 2020)、2019年の資源評価では寿命を18歳とした。




図4. 大西洋におけるキハダの産卵場と産卵期 (月) 卵巣標本を収集し、組織学的観察により確認されたもの。地図上の範囲は、標本採集場所を表す。




図5. 各大洋における日本はえ縄漁業によるキハダの平均漁獲物サイズ (尾叉長 cm) の一例 (2000年代)

表1. 大西洋におけるキハダの年齢ごとの尾叉長 (cm) と体重 (kg) の関係

2つの成長式 (2019年資源評価でのSSによる推定値、Gascuel *et al.* (1992)、Draganik and Pelczarski (1984)) について示す。

年齢	2019年の資源評価での値		Gascuel <i>et al.</i> 1992		Draganik and Pelczarski 1984	
	尾叉長 (cm)	体重 (kg)	尾叉長 (cm)	体重 (kg)	尾叉長 (cm)	体重 (kg)
0	5	0.0	38	1.1	0	0.0
1	48	2.2	48	2.2	60	4.1
2	86	12.4	78	9.3	101	19.7
3	115	29.0	120	32.8	129	41.2
4	132	44.2	148	62.4	149	62.7
5	142	54.7	163	83.0	162	81.3
6	147	61.0	170	93.5	172	96.0
7	150	64.5	173	98.3	178	107.2
8	151	66.3	174	100.3	182	115.4
9	152	67.3	175	101.1	186	121.3
10	153	68.0	175	101.4	188	125.4




図6. 大西洋におけるキハダの成長 (2019年資源評価での値)




図7. 大西洋におけるキハダの資源量指数

上：はえ縄国のデータを統合した資源量指数（1979～2018年）  
 中：まき網素群れ操業及びベネズエラはえ縄の資源量指数（1991～2018年）。下：FAD漁業に用いるエコーサウンダーブイのデータを利用した小型魚の資源量指数（2010年第1四半期～2017年第4四半期）。

### 資源状態

最新の資源評価はICCATにより2019年に行われた。資源評価モデルは、2種類のプロダクションモデル（Surplus production model：MPB、Just Another Bayesian Biomass Assessment：JABBA）及び統合モデル（Stock Synthesis：SS）が用いられた。資源量指数として、各国・地域（日本、米国、韓国、ブラジル、台湾）はえ縄漁業を統合した指数（1979～2018年、年別）を使用（北大西洋、熱帯域、南大西洋の3種、このうちベースモデルには熱帯域を使用）。また、EUまき網漁業素群れデータを用いた指数（1993～2018年、年別）と加入に関する指数（FAD漁業で用いるエコーサウンダーブイ（魚探が付いていてその情報を無線で送信し、離れた場所から鰯集魚群量をモニターできるブイ）データからの指数）（2010～2018年、四半期別）も使用した（図7）。前回は、まき網漁業の単位努力量当たりの漁獲量（CPUE）に関しては、継続的な漁労技術、探索機器の発達があるため、漁獲効率も上昇していると考えられるが、この変化を適切に推定することは難しい。このため、まき網のCPUEの標準化は困難として、漁獲の多くを占めるにもかかわらず、まき網のCPUEは資源量指数としては用いられなかったが、今回はFAD漁業で用いるエコーサウンダーブイのデータを用いる等の新たな展開がみられた。

MSYは12.1（9.0～26.7）万トンと推定され、2018年の漁獲量より小さい。2018年の資源量はMSYレベルより大きく（ $B_{2018} / B_{MSY} = 1.17$ （0.75～1.62））、2018年の漁獲率はほぼMSYレベルである（ $F_{2018} / F_{MSY} = 0.96$ （0.56～1.50））と推定された。したがって、2018年において、本資源は乱獲状態ではなく、本資源への漁獲率は適正なレベルであったといえる（図8、9）。将来予測（3モデル統合）では、将来的な漁獲量13万トン（現状の漁獲量）で2033年（15年後）に神戸プロットにおけるグリーンゾーン確率38%、11万トン（TAC）で2033年にグリーンゾーン確率86%と推定された（ICCAT 2019）（表3）。近年の資源量のレベルはMSYレベルをやや上回っており、その動向は、横ばいである。したがって、資源水準と動向は中位で横ばいと考えられる。

表2. 大西洋におけるキハダの年齢ごとの自然死亡係数

2019年、2016年の資源評価で用いた固定値、Gascuel *et al.*（1992）、Draganik and Pelczarski（1984）による推定値を示す。

年齢	2019年の資源評価での値	2016年の資源評価での値	Gascuel <i>et al.</i> 1992	Draganik and Pelczarski 1984
0	0.66	0.60	1.19	0.89
1	0.48	0.60	0.75	0.67
2	0.40	0.60	0.55	0.58
3	0.37	0.60	0.48	0.53
4	0.35	0.60	0.45	0.50
5	0.34	0.60	0.44	0.48
6	0.34	0.60	0.43	0.46
7	0.34	0.60	0.43	0.46
8	0.33	0.60	0.43	0.45
9	0.33	0.60	0.43	0.45
10	0.33	0.60	0.43	0.44



表3. 将来予測

漁獲量一定（6万～15万トン）で、資源と漁獲圧が健全な状態（ $B/B_{MSY} > 1$ 、 $F/F_{MSY} < 1$ ）である確率。  
 将来予測はSSでは multivariate normal (MVN) iterations の手法を用いた。個々の一定漁獲量の条件あたり 2,500 回の繰り返しを、それぞれのシナリオで行った。F/F<sub>MSY</sub>が4以上、0.2以下になる場合は、それぞれ4、0.2となるようにした。MPBは500回のブートストラップ試行が行われた。JABBAはシナリオあたり36,000回のMCMC iterationを行った。最終的に表2を作成するために、9つのシナリオが等価の重みとなるように統合した。

TAC   Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	64	84	95	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60000	64	75	85	92	96	97	98	99	99	100	100	100	100	100
70000	64	74	83	90	94	96	97	98	98	99	99	99	100	100
80000	64	72	79	86	91	94	96	97	97	98	98	99	99	99
90000	64	70	77	82	87	90	92	94	95	96	97	97	98	98
100000	64	68	73	77	82	85	87	89	90	92	93	94	94	95
110000	64	66	69	72	75	77	79	81	82	83	84	85	86	86
120000	63	63	64	65	65	66	66	67	67	68	65	65	66	66
130000	58	57	56	54	52	50	47	46	45	44	43	42	38	38
140000	48	45	42	38	35	31	29	26	24	22	21	20	20	19
150000	39	34	30	25	21	17	15	13	12	12	11	10	9	7




図8. 大西洋キハダの資源解析結果  
 2種類のプロダクションモデル(MPBは1シナリオ及びJABBAは4シナリオ)及び統合モデル(SSは4シナリオ)による実際の資源量と持続可能な資源量の比 ( $B/B_{MSY}$ 、上)、実際の漁獲圧と持続可能な漁獲圧の比 ( $F/F_{MSY}$ 、下)の推移(1950～2018年)。

管理方策

2019年11月のICCAT年次会合でTACを引き続き11万トンとすることが合意された。また、従来のFAD操業の制限(2019年1月1日～2月28日の2か月間、南緯4度、北緯5度、西経20度、アフリカ大陸で囲まれた海域で操業禁止)は強化され、2020年には1～2月の2か月間、さらに2021年には1～3月の3か月間において、大西洋全体におけるFAD操業の禁止が決定された。2021年11月のICCAT年次会合において熱帯まぐろ保存管理措置が一部改定され、2022年は、FAD禁漁(大西洋全体)は1月1日～3月13日の72日間に決定された(それ以外は同じ措置を2022年も継続)。




図9. 大西洋キハダの資源解析結果(各モデルの結果を統合)  
 図8で示した9つのシナリオの2018年の資源状況についての統合した結果。青丸は2018年の状態を示す。黒丸は4,500回(9シナリオ×500回)のモデル設計やデータの不確実性を考慮した試行の分布を示す。縦軸は漁獲圧、横軸は資源量で現状/持続可能な値の比で示す。神戸プロットの上側と右側に、それぞれ横軸、縦軸についての頻度分布図を示す。

【管理戦略評価(MSE)の検討状況】

「4. マグロ類RFMOにおける管理方策(総説)」のMSEに関する一般的な説明を参照のこと。

執筆者

かつお・まぐろユニット  
 熱帯まぐろサブユニット  
 水産資源研究所 水産資源研究センター  
 広域性資源部 まぐろ第3グループ  
 松本 隆之・横井 大樹

参考文献

Andrews, A.H., Pacicco, A., Allman, R., Falterman, B.J., Lang, E.T., and Golet, W. 2020. Age validation of yellowfin (*Thunnus albacares*) and bigeye (*Thunnus obesus*) tuna of the northwestern Atlantic Ocean. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 47: 637–643. Doi: 10.1139/cjfas-2019-0328  
 Arocha, F., Lee, D.W., Marciano, L.A., and Marciano, J.S. 2001.

Update information on the spawning of yellowfin tuna, *Thunnus albacares*, in the western central Atlantic. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 52(1): 167-176.

Caverivière, A., Conand, F., and Suisse de Saint-Claire, E. 1976. Distribution et abondance des larves de thonidés dans l'Atlantique tropical oriental. Etude des données de 1963 a 1974. Doc. Sci. Cent. Rech. Océanogr. Abidjan. ORSTOM, 7(2): 49-70.

Diaha, N.C., Zudaire, I., Chassot, E., Pecoraro, C., Bodin, N., Amandè, M.J., and Gbeazere, D.A. 2015. Present and future of reproductive biology studies of yellowfin tuna (*Thunnus albacares*) in the eastern Atlantic Ocean. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT: 71(1): 489-509.

Draganik, B., and Pelczarski, W. 1984. Growth and age of bigeye and yellowfin tuna in the central Atlantic as per data gathered by R/V "Wieczno. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 20(1): 96-103.

FAO FishFinder. FI Institutional Websites. In FAO Fisheries and Aquaculture Department (online). Rome. <http://www.fao.org/fishery/> (2021年12月15日)

Gascuel, D., Fonteneau, A., and Capisano, C. 1992. Modélisation d'une croissance en deux stances chez albacore (*Thunnus albacares*) de l'Atlantique Est. Aquatic Living Resources, 5 (3): 155-172. <https://www.alr-journal.org/articles/alr/abs/1992/03/alr92302/alr92302.html> (2021年12月15日)

ICCAT. 2001. Report of the ICCAT SCRS Atlantic yellowfin tuna stock assessment session (Cumaná, Venezuela, July 10 to 15, 2000). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 52(1): 1-148.

ICCAT. 2019. Report of the standing committee on research and statistics (SCRS) (Madrid, Spain, 30 September to 4 October, 2019). 459 pp. [https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2019/REPORTS/2019\\_SCRS\\_ENG.pdf](https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2019/REPORTS/2019_SCRS_ENG.pdf) (2021年12月15日)

ICCAT. 2021. Report of the standing committee on research and statistics (SCRS) (Online, 27 September to 2 October 2021). 282 pp. [https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2019/REPORTS/2019\\_SCRS\\_ENG.pdf](https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2019/REPORTS/2019_SCRS_ENG.pdf) (2021年10月11日)

Lorenzen, K. 2005. Population dynamics and potential of fisheries stock enhancement: practical theory for assessment and policy analysis. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1453): 171-189. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636107/pdf/rstb20041570.pdf> (2021年12月15日)

Ortiz, M. 2001. Review of tag-releases and recaptures for yellowfin tuna from the U.S. CTC program. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 52(1): 215-221.

Schaefer, K. 1996. Spawning time, frequency and batch fecundity of yellowfin tuna, *Thunnus albacares*, from

Clipperton Atoll in the eastern Pacific Ocean. Fish. Bull., 94: 98-112. <https://spo.nmfs.noaa.gov/sites/default/files/pdf-content/1996/941/schaefer.pdf> (2021年12月15日)

キハダ（大西洋）の資源の現況（要約表）

資源水準	中位
資源動向	横ばい
世界の漁獲量 (最近5年間)	13.5万～15.0万トン 最近(2020)年: 14.9万トン 平均: 14.2万トン(2016～2020年)
我が国の漁獲量 (最近5年間)	0.3万～0.4万トン 最近(2020)年: 0.3万トン 平均: 0.3万トン(2016～2020年)
管理目標	MSY: 12.1(9.0～26.7)万トン
資源評価の方法	プロダクションモデル(MPB, JABBA) 統合モデル(SS)
資源の状態	B <sub>2018</sub> /B <sub>MSY</sub> : 1.17(0.75～1.62) F <sub>2018</sub> /F <sub>MSY</sub> : 0.96(0.56～1.50)
管理措置	TAC(11万トン) 大西洋全体におけるFADを利用した まき網操業の禁止(2020年は1～2月 の2か月間、2021年は1～3月の3 か月間、2022年は1月1日～3月13 日の72日間)
管理機関・関係機関	ICCAT
最近の資源評価年	2019年
次回の資源評価年	2023年(暫定的なスケジュール)

付表1. 大西洋キハダの年別、国別漁獲量 (単位: トン、1950~2020年)

Table with columns for years from 1950 to 2020 and rows for various countries including USA, Canada, Mexico, and others. The table contains numerical data representing catch volumes in tons.





付表 1. (続き)

国名/年	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
アンゴラ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	150	0
アルゼンチン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バルバドス	129	131	195	188	218	282	324	270	248	121	173
ベリーズ	2,108	3,284	5,929	5,855	7,105	7,132	5,680	6,170	8,743	10,107	9,341
ベニン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブラジル	3,677	3,615	4,639	7,277	11,645	13,643	16,882	18,382	16,381	12,907	13,183
カンボジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カナダ	168	93	83	74	34	59	193	15	15	108	75
カメルーン	6,093	4,036	7,528	4,763	7,868	6,438	2,876	5,562	3,698	6,239	0
ケイマン諸島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国	427	346	264	211	92	170	488	578	369	321	461
台湾	824	1,788	1,070	1,259	1,041	1,220	942	776	945	736	870
コロンビア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンゴ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コートジボワール	470	387	1,748	2,194	348	251	315	952	116	2,649	4,460
キューバ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キュラソー	5,397	4,501	6,906	3,613	5,230	6,267	8,012	6,661	7,615	7,773	9,081
ドミニカ国	110	132	119	120	256	194	209	194	0	0	0
ドミニカ共和国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エルサルバドル	0	0	0	0	0	2,761	8,633	6,316	5,577	3,976	8,613
フィリピン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フランス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フランス領ポリネシア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガボン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガンビア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジョージア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガーナ	20,252	18,501	16,470	13,921	18,939	20,218	20,398	24,346	26,243	25,083	25,083
グレナダ	673	0	0	0	0	1,167	1,607	1,257	1,391	818	784
グアテマラ	3,168	2,811	2,961	4,036	3,773	5,200	2,720	3,718	2,539	2,857	2,594
赤道ギニア	882	199	0	2	11	9	6	0	8	10	8
ガイアナ	0	0	0	0	0	14	183	181	3	43	116
グアテマラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホンジュラス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハイチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本	4,980	4,484	4,668	4,577	3,824	3,470	3,276	3,123	3,093	4,056	2,687
リベリア	0	49	71	89	100	88	76	88	1	0	1,731
リビア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モロッコ	44	272	55	137	107	72	115	113	108	228	344
モリタニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メキシコ	916	1,174	1,414	1,024	1,045	988	1,279	1,241	1,028	760	817
Mixed flags (EU tropical)	857	1,601	1,601	0	1,855	1,691	1,155	1,567	0	0	0
ナミビア	9	90	24	6	15	42	53	424	82	327	0
NEI (EU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEI (Flag related)	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
フィジー	7,295	5,595	6,668	6,057	5,548	4,762	6,168	6,684	6,175	8,245	8,213
フィジー領トonga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パナマ	89	134	34	128	76	0	0	0	0	0	0
フィリピン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロシア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セントクリストファー・ネイビス	0	0	0	0	0	1	5	29	13	0	6
セネガル	939	1,235	1,875	1,081	603	1,883	6,850	3,988	5,029	8,161	8,142
セイシェル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南アフリカ	235	673	174	440	1,512	925	706	387	389	551	700
スリナム	0	1,949	1,929	0	0	0	0	0	0	0	0
トリニダード・トバゴ	788	789	931	1,128	1,141	1,179	1,057	890	1,214	982	973
トンガ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツバル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バングラデシュ	743	341	336	146	17	0	0	0	0	0	0
バハマ	4,783	4,419	4,837	5,050	3,772	3,127	4,204	5,059	2,743	2,029	1,891
ベネズエラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デンマーク	25,940	21,418	19,026	12,162	14,733	21,199	19,625	12,665	10,908	14,756	19,618
スペイン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エストニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フランス	20,978	23,083	19,265	20,776	23,338	21,093	26,488	26,178	25,069	18,609	17,889
フィリピン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イタリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラトビア	200	143	15	0	0	23	0	0	0	0	0
リトアニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ルーマニア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポランド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポルトガル	653	579	447	339	71	76	127	137	638	256	128
英国	23	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ギニア	383	682	2,435	1,970	1,283	0	0	0	0	0	0
韓国	380	490	498	212	116	47	388	411	455	507	579
セントメレンゼ	169	173	177	182	186	301	266	3	8	58	8
セントビンセント	882	963	551	352	505	153	434	772	373	105	228
セントセントヘレン	66	163	149	53	152	178	181	221	199	310	87
米国	2,679	3,315	4,777	4,177	3,184	2,798	4,104	4,444	2,720	2,625	3,655
ロシア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロシア連邦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロシア連邦(トonga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロシア連邦(カカス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英国(バハマ)	37	100	66	36	12	10	9	25	32	50	52
英国(バハマ)	0	1	1	3	10	5	0	0	0	0	0
英国(タークス・カイコス諸島)	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0
セントルシア	223	114	98	196	83	175	191	232	199	172	0
総計	118,274	119,904	115,614	108,130	114,904	130,482	150,368	137,122	136,469	135,133	148,894