

ネズミザメ

北太平洋

(Salmon Shark *Lamna ditropis*)



管理・関係機関

中西部太平洋まぐろ類委員会 (WCPFC)

大西洋まぐろ類保存国際委員会 (ICCAT)

インド洋まぐろ類委員会 (IOTC)

全米熱帯まぐろ類委員会 (IATTC)

みなみまぐろ保存委員会 (CCSBT)

北西大西洋漁業機関 (NAFO)

国際海洋開発理事会 (ICES)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (ワシントン条約: CITES)

北太平洋まぐろ類国際科学委員会 (ISC)

最近の動き

2022年、ICESとICCATが共同で北東大西洋のニシネズミザメの資源評価を行うにあたって、2021年11月末にデータ準備会合が行われた。2020年にICCATで行われた、北東大西洋を除く大西洋海域のニシネズミザメの資源評価では、北西系群は依然として乱獲状態であるが（最大持続生産量（MSY）を実現する資源量に対する実際の資源量の割合： B_{2018}/B_{MSY} :0.57）、順調に回復しており、過剰漁獲の可能性は低く（MSYを実現する漁獲係数に対する実際の漁獲係数の割合： $F_{2010-2018}/F_{MSY}$:0.413）、現行の漁獲量（47トン：1,567個体に相当）を維持すれば、資源は50%以上の確率で2030～2035年にはMSY水準に回復すると予測された。南系群については、漁業データや生物データの不確実性が大きいと、資源量の状態は不明とされたが、過剰漁獲の可能性は低いとの結論となった。

利用・用途

肉はソーセージやみそ漬け、鰭はフカヒレ、脊椎骨は医薬・食品原料、皮は革製品として利用されている。両種ともにサメ類の中では肉質が良好で商品価値が高く、ネズミザメについては内臓の一部も食用として利用されている。

漁業の概要

ネズミザメは北太平洋の亜寒帯域に生息し、沿岸から外洋まで出現する。主としてはえ縄や流し網によって漁獲され、その多くが宮城県の気仙沼港を中心とした東北地方に水揚げされ

ニシネズミザメ

北大西洋・南半球

(Porbeagle *Lamna nasus*)



ている。水産庁は委託事業「日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業（平成12～17年度）」、「日本周辺国際魚類資源調査（平成18～27年度）」、「国際漁業資源評価調査・情報提供事業 現場実態調査（平成28～29年度）」及び「水揚げ地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果（平成30～31年度、令和2年度）」でまぐろはえ縄漁業等による日本の主要漁港へのサメ類の種別水揚げ量を調査している。それによると1992～2020年におけるネズミザメの年間水揚げ量は、はえ縄が289～2,926トン、流し網が270～2,029トン、全体では1,136～4,406トンであった。水揚げ量は2004年頃までは緩やかな増加傾向が見られ、その後2009年までは増減を繰り返しながら推移した（図1）。2011年は、東日本大震災の影響で水揚げ量は大幅に減少して1,136トンであったが、2012年に3,075トン、2013年に3,309トン、2015年には3,512トンが水揚げされ、震災前のレベル（1992～2010年の水揚げ量の平均：3,001トン）にまで回復した。2016年の水揚げは流し網による漁獲が落ち込んだため1,939トンと減少したが、2017年には流し網による漁獲量の回復により3,549トンまで再び増加している。2020年の総水揚げ量は、前年と比べてはえ縄による水揚げ量が減少したことにより、2019年より738トン減少した2,690トンであった。サメ類の総漁獲量に占めるネズミザメの割合は15～31%であり（2005～2020年）、ヨシキリザメに次いで多い。

一方、近縁種であるニシネズミザメは北大西洋及び南半球の




図1. 日本の主要漁港へのネズミザメ水揚げ量

水産庁調査委託事業により収集されたデータをもとに作成（水産庁 1993-2001、水産総合研究センター 2002-2016、水産研究・教育機構 2017-2020）。

温帯～亜寒帯域に生息し、はえ縄や流し網によって漁獲されている。北大西洋では本種を対象とした漁業が存在し、1920年代から北東部の個体群の利用が始まり、1960年代に個体数が激減すると漁業の中心は北北大西洋に移動した。1961年に北西部の個体群の利用が始まると、1960年代、1990年代に2度個体数が激減した。ICCAT事務局が公表する漁獲統計によれば、1990～2014年の北大西洋の個体群の漁獲量は1994年の2,771トンピークとして、2011年の99トンに至るまで一貫した減少傾向を示している。その後は2014年の294トンまで増加傾向を示したが、2016年以降は30～40トンを推移しており（ICCAT 2020）、2019年の漁獲量は約16トンで多くが米国における漁獲となっている（Anon. (ICCAT) 2020）。2020年は14トンと前年よりやや減少した（米国とカナダが約10トン）。漁法別で見ると、1991～2000年までは、はえ縄による漁獲量がその他表層漁業による漁獲量を2～4倍の範囲で上回っていたが、2001年以降はその差は小さくなり、2014年以降は両漁法による漁獲量はほぼ等しくなっている。2019年以降は、はえ縄による漁獲量は0トンで、大部分がその他表層漁業による漁獲となっている。国別には、1990～2000年代ごろまでは、カナダ、フランス、フェロー諸島（1994年以降は50トン以下）による水揚量が北大西洋全体の80%前後を占めていたが、その後急激に減少し、2015年以降は各国の漁業規制により各国の水揚量は5トン以下にまで減少している。これに関連して、北西域では2014年から投棄量の報告が増え始め（2016～2020年平均：11トン）、水揚量（2016～2020年平均：12トン）と同等の規模となっている。南大西洋では、本種は主にマグロ・カジキ類を対象としたはえ縄漁業での混獲物であり1991～2019年の漁獲量は0～385トンで、1991年から増減しながら2010年の16トンまで減少を続け、その後2014年の38トンまで増加したが、2015年には3トンまで減少し、以降は5トン未満を推移している（2019年の報告値は0トン）。漁法別に見ると、2014年を除き、ほぼ全てがはえ縄で漁獲されている。

生物学的特性

【分布】

ネズミザメは北太平洋の亜寒帯域の沿岸から外洋まで広く分布している（中野 1996）（図2上）。電子標識（ポップアップタグ）を用いた研究によって、本種は亜寒帯～亜熱帯まで、水温2～24℃と幅広い環境を利用し、冬季には水温2～8℃の低水温下で生息することが確認されている（Weng *et al.* 2005）。また、北東太平洋でネズミザメの雌68個体に対して行われた研究によって、放流個体は北東太平洋を広く利用し、季節的な回遊を行っていることが明らかとなった（Weng *et al.* 2008）。ニシネズミザメは北大西洋及び南半球の温帯～亜寒帯域に分布しており（Compagno 2001）（図2下）、ポップアップタグを用いた研究によれば、主に6～20℃の水温帯に滞在することが報告されている（Skomal *et al.* 2021）。アイルランド近海では夏期に未成魚が沿岸域に多く集合すると考えられている（Cameron *et al.* 2019）。

ネズミザメの系群構造については、北太平洋内において1系群とする説と東西2系群とする説があるが、まだ結論は出




図2. ネズミザメ（上）とニシネズミザメ（下）の分布（Compagno 2001）

色の濃い部分は信頼できる情報に基づく既存の分布あるいは確かに分布していると思われるエリア、薄い部分は分布が推定されるもしくは不確実な情報に基づく分布エリアを示す。

いない。

ニシネズミザメは繁殖周期が大洋の南北で逆になることと、南半球における分布が連続していると想定されることから、南北で別系群と考えられる。北大西洋・南大西洋・インド洋（ミナミマグロ漁場）において収集されたニシネズミザメの標本を分析した分子遺伝学的研究によれば、北大西洋はその他の2つの海域とは明瞭に分かれるものの、南大西洋とインド洋の標本間の遺伝的な差は小さいことが示されている（Kitamura and Matsunaga 2008, González *et al.* 2020）。一方で、はえ縄で同じく混獲されるヨシキリザメやアオザメに比べると沿岸性が強く（Pade *et al.* 2009）、外洋域での分布密度が小さくなる点から、大西洋では東西に分かれているとの見方も存在し、ICCATにおいては南北とともに東西に分けた資源評価が行われている。しかし、近年の研究では、南北の系群ともに広範囲な移動を示す個体がいること（Saunders *et al.* 2011, Francis *et al.* 2015）、南半球の個体群については、1）外洋域を含めて広く分布すること、2）一部の個体はミナミマグロはえ縄漁業の主な操業域（南限南緯45度付近）よりさらに高緯度域に分布すること、3）幼魚は、未成魚や成魚よりも高水温の環境に分布すること、4）妊娠個体はこれまでニュージーランド・オーストラリア周辺でのみ報告されていたが、南アフリカのケープ沖にも分布することが報告されている（谷津 1995, Semba *et al.* 2013）。南西大西洋の高緯度域（南緯51～57度）で収集されたオブザーバーデータの解析結果によれば、南緯54度12分より南に位置する大陸棚外縁に分布密度の高い海域が存在すると推定されている（Cortés and Waessle 2017）。

【産卵・回遊】

両種の繁殖様式は卵食・共食型の非胎盤型胎生であり (Wourms 1977)、産仔数と出生体長はネズミザメがそれぞれ 3.8 尾 (Conrath *et al.* 2014) から 4~5 尾 (田中 1980a)、約 70 cm (尾鰭前長) (田中 1980a)、ニシネズミザメはそれぞれ 4 尾、58~67 cm (尾叉長) (Francis and Stevens 2000、Jensen *et al.* 2002) と報告されている。ネズミザメについては、秋に排卵後交尾し、9~10 か月の妊娠期間を経て出産すること、繁殖周期は 2 年の可能性があることが示されている (Conrath *et al.* 2014)。ニシネズミザメについては、北大西洋では交尾期が 9~11 月、妊娠期間が北大西洋・南太平洋ともに 8~9 か月と推定されており、北大西洋の研究では繁殖周期は 1 年であることが示唆されているが、近年、休止期の成熟雌の存在が報告され、一部の成熟雌は毎年再生産を行わない可能性が指摘されている (Natanson *et al.* 2019)。交尾場、出産場等についての知見は乏しいが、出産期はネズミザメが 3~5 月 (田中 1980a)、北大西洋のニシネズミザメが春~夏 (4~6 月)、南

太平洋のニシネズミザメでは冬 (6~7 月) (Francis and Stevens 2000、Jensen *et al.* 2002) と推定されている。

回遊については両種とも季節的な南北移動を行い (田中 1980a、谷津 1995、Francis *et al.* 2015)、日周鉛直移動を行うことが示唆されている (Carlisle *et al.* 2011、Francis *et al.* 2015、Coffey *et al.* 2017) (図 3-1、3-2)。北東太平洋で行われた研究によれば、アラスカ沿岸域で放流されたネズミザメは、アラスカ沿岸の沈降流、亜寒帯循環、移行域、亜熱帯循環、カリフォルニア海流と多様な海洋環境を経験する中で、鉛直移動パターンを変化させており、沖合域では沿岸域よりも深い水深帯を利用すること、溶存酸素濃度が低い環境も利用していると推定されている (Coffey *et al.* 2017)。ベーリング海で捕獲した雄 2 個体の行動を長期間追跡した報告によれば、それぞれ移動の方向は異なっていたものの、いずれも季節的な南北回遊を行うこと (秋冬に南下、春夏に北上)、研究期間中 8~9 月はベーリング海に滞在あるいは回遊してくることが明らかとなった (Garcia *et al.* 2021)。北北大西洋のニシネズミザメに電子標




図 3-1. 北東太平洋において亜熱帯循環流を遊泳中のネズミザメ 2 個体の遊泳深度 (縦軸) と周辺水温の情報

水温は右のカラーバーの色に対応し、横軸は時系列 (LD59 の個体は 3 月 5 日から 3 月 12 日まで、LD90 の個体は 11 月 8 日から 11 月 15 日まで) を示す。各個体の図の上の白黒のバーは、白色部分が日中、黒色部分が夜間を示す。Coffey *et al.* (2017) より引用。




図 3-2. ニューゼaland近海で放流されたニシネズミザメ 3 個体 (Shark1、Shark2、Shark12) の昼夜別、水深帯別の滞在時間

Shark1 は 2 つの期間、Shark2 と Shark12 は 3 つの期間にデータが分かれており、白いバーは日中、黒いバーは夜間の深度別の分布頻度を示す。Francis *et al.* (2015) より引用。

識を用いた調査によれば、雄と未成熟個体（雌雄）は放流後カナダ東方沖の大陸棚の冷水域に留まる一方、成熟した雌は冬季にはサルガッソー海まで南下していることが示され、出産場はこれまで報告されていた分布域よりも南にある可能性がある（Campana *et al.* 2010）。同海域で行われた最近の研究でも、季節的な生息域の変化（夏～初秋は大陸棚付近に滞在し、冬～春にかけて沖合域に移動）とこれに伴う鉛直行動の変化や沖合域での多様な鉛直行動パターンが報告されている（Skomal *et al.* 2021）。また、北東大西洋に位置するビスケー湾で実施された電子標識放流調査によれば、6月に放流された8個体の雌と1個体の雄は、晩夏に約2,000 km 移動した後、翌年の春に放流地点に戻る行動を示している（Biais *et al.* 2017）。近年、アイルランドで放流されたニシネズミザメが10年後にカナダ近海で再捕され、大西洋を横断する回遊を行う事例が初めて報告された（Cameron *et al.* 2018）。また、ネズミザメの場合、幼魚は亜寒帯境界付近（中野 1996）やカリフォルニア海流系（Carlisle *et al.* 2015）を生育場にいると推測されている。

【成長・成熟】

両種ともに脊椎骨に形成される輪紋から年齢が推定されており、ネズミザメについては、北西太平洋（田中 1980a）、北東太平洋（Goldman and Musick 2006）の個体群について成長式が推定されている（図4）。ニシネズミザメについては、北大西洋（Aasen 1963、Natanson *et al.* 2002）、南太平洋（Francis *et al.* 2007）、インド洋（ミナミマグロ漁場）（森信 1996）の個体群についての成長式が推定されている（図5）。ネズミザメについては東西の違いは小さいが、ニシネズミザメについては北大西洋個体群と南太平洋個体群の成長曲線は大きく異なっており、インド洋の個体群の成長式は両者の間に位置している。成熟体長と年齢は、ネズミザメは北西部では雌180 cm（尾鰭前長）で8～10歳、雄140 cm（尾鰭前長）で5歳、北東部では雌165 cm（尾鰭前長）で6～9歳、雄124 cm（尾鰭前長）で3～5歳と推定されている（田中 1980a、Goldman and Musick 2006）。またニシネズミザメについては、北大西洋では雌212～218 cm（尾叉長）で13～14歳、雄174～175 cm（尾叉長）で7～8歳と報告されている（Campana *et al.* 1999、Jensen *et al.* 2002）。南太平洋では雌165～180 cm（尾叉長）で15～18歳、雄140～150 cm（尾叉長）で8～11歳と報告されている（Francis and Stevens 2000）。寿命は、ネズミザメの場合、雌が20年、雄が25年以上（田中 1980a、Goldman and Musick 2006）、ニシネズミザメは北大西洋で20～46年（Aasen 1963、Campana *et al.* 2002、Natanson *et al.* 2002）、南太平洋で最大65年（Francis *et al.* 2007）と推定されている。なお、ネズミザメは最大305 cm（全長）・175 kgまで、ニシネズミザメは最大350 cm（全長）・230 kgに達すると報告されている。

【食性・捕食者】

ネズミザメは、北緯48度以北の大型魚がサケ・マス類やイカ類、北緯48度以南の小型魚が多獲性浮魚類（イワシ類、サンマ等）やイカ類を多く摂取している（佐野 1960、1962、川崎ほか 1962、田中 1980b）。本種の摂餌行動については、は




図4. ネズミザメの成長曲線




図5. ニシネズミザメの成長曲線

っきりとした日周性は報告されておらず、生息域に豊富にいる利用しやすい餌生物を食べる日和見食者であると考えられている（Kubodera *et al.* 2007）。ニシネズミザメも魚類・頭足類等を中心として摂餌する日和見食者と考えられているが、季節回遊に関連した食性の変化（春：表層の浮魚類、秋：深層の底魚類）（Joyce *et al.* 2002）やサイズによる食性の変化（Belleggia *et al.* 2021）が報告されている。アルゼンチン近海においては、ホキやパタゴニアミナミダラなどの漁獲対象種を多く捕食しており、漁業活動との関連性が指摘されている（Belleggia *et al.* 2021）。また、捕食者については両種ともによく知られていない。

資源状態

ネズミザメに関しては、Nakano and Honma (1996) が提案したまぐろはえ縄漁船の漁獲成績報告書のサメ類報告率（航海あたりのサメ類漁獲日の割合）から、信頼性の高いデータを選別する方法を用いて単位努力量当たりの漁獲量（CPUE）の標準化が我が国において行われている。具体的には、1993～2007年にかけてのまぐろはえ縄漁船の漁獲成績報告書から、1航海あたり80%以上の操業でサメ類の漁獲が報告されたデータを抜き出し、一般化線形モデル（GLM）で標準化したネズミザメのCPUEを算出した。その結果は予備的ではあるが、1994～1998年、2003～2007年にかけて増減はあるものの、一定した傾向は認められなかったため、解析期間中にネズミザメの資源状態は大きく変化はしていなかったものと考えられる（図6）。以上のことから、資源水準は調査中、動向は横ばいと判断した。




図 6. 北太平洋における日本のはえ縄漁業データを基に標準化したネズミザメの CPUE

南半球のニシネズミザメに関しては、南米ウルグアイ沖では CPUE の減少傾向が報告され、資源の減少が懸念されているが (Pons and Domingo 2009)、より広範囲の漁業データを使った解析結果では、顕著な減少傾向は見られていない。例えば、松永ほか (2012) は、南アフリカ沖やオーストラリア西岸沖に至るミナミマグロ漁場において、日本のミナミマグロ漁業の科学オブザーバー調査で収集されたニシネズミザメの混獲データをもとに、GLM によって CPUE を標準化した。その結果をみると、1992～2010 年の CPUE は増減を繰り返していたものの、解析期間を通じて連続した減少傾向は見られていない (図 7)。また、Semba *et al.* (2013) は、1994～2011 年の期間に南半球で収集された日本のはえ縄漁業の漁獲成績報告書及び開発調査センターが 1982～1990 年の期間に南太平洋で実施した流し網調査のデータを用いて本種の CPUE を標準化した。その結果、CPUE に一定した減少傾向は見られないことを報告している。2015 年から、南半球に生息するニシネズミザメに関して資源状態の推定等を行う ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) プロジェクトが開始された。このプロジェクトでは、関係国 (日本、アルゼンチン、チリ、ニュージーランド、ウルグアイ) が保有する漁業データを用いて、資源量指数 (CPUE)、体長や性比の年トレンド等に基づき資源状態の傾向を包括的に解析するとともに、本系群の生産力に対し、現在の漁獲強度が持続的なレベルであるか否かをリスク評価の枠組みで検討した。その結果、南半球全体で見ると、本系群に対する漁獲強度は非常に低く (絶滅を引き起こすインパクトの 9%以下)、海区別に見るとインド洋東部から太平洋西部にかけて低くなる傾向が見られた (Common Oceans (ABNJ) Tuna Project 2017) (図 8)。この結果は、漁具にかかった個体の死亡率を 100%と仮定した場合の推定値のため、生存個体の放流を適切に実施している場合は、現行の漁獲強度のインパクトは更に低くなると考えられる。これらの結果から、本系群の資源状態は不明であるものの、乱獲のリスクは極めて低いと判断された (WCPFC 2017)。

大西洋のニシネズミザメに関しては、2020 年に ICCAT において第 2 回目の資源評価が行われ、大西洋の北西部、南西部、南東部の 3 系群を仮定した解析が行われた (北東部については、2022 年に ICES 板鰐類作業部会が ICCAT と共同で評価予定)。2010 年以降、各種規制 (漁獲量規制・生存放流の義務・




図 7. ミナミマグロ漁場において、日本の科学オブザーバーが収集したデータを基に標準化したニシネズミザメの CPUE (松永ほか 2012)

CITES 等) の影響により資源評価に必要な漁業情報が著しく減少し、特に漁獲量の不確実性が大きく一般的な資源評価モデルで用いられる CPUE の情報が利用できないため、Incidental Catch Model (ICM)、生態学的リスク評価 (Ecological Risk Assessment: ERA、Sustainability Assessment for Fishing Effects: SAFE アプローチ) の 2 つの手法を用いて資源評価が行われた (ICCAT 2020)。これらの手法は、生活史パラメータ、サイズデータ、ICCAT 事務局が保有する漁獲統計 (漁獲量、努力量等) の情報に基づき、資源量 (ICM) や漁獲圧 (ERA) を推定するものである。利用できるデータの制約から、ICM は北西のみ、ERA は北西と南資源 (南西+南東) に適用された。これらの結果を統合した結果、北西系群については、資源量は依然として MSY 水準を下回るが (B_{2018}/B_{MSY} : 0.57)、順調に回復しており (図 9)、近年漁獲量が大きく減少していることから、過剰漁獲の可能性は低いとされた ($F_{2010-2018}/F_{MSY}$: 0.413)。ICM の将来予測によれば、北西系群については、現行の漁獲量 (47 トン: 1,567 個体に相当) を維持すれば、資源量は 50% 以上の確率で 2030～2035 年には MSY 水準に回復すると予想された (図 10)。南系群については、漁業データや生物データの不確実性が大きいため、資源状態は不明、との結論となったが、漁獲圧は低く ($F_{2010-2018}/F_{MSY}$: 0.113) 過剰漁獲の可能性は低いとされた。この結果は、前述の ABNJ による南半球系群のリスク評価の結論と概ね一致している。今後は、放流個体数の正確な報告や放流後死亡率の推定等、投棄量の報告精度を向上する努力がより一層求められる。各系群で適用された資源評価モデル及びその結果は要約表に示す。

管理方策

全てのマグロ類 RFMO において、漁獲されたサメ類の完全利用 (頭部、内臓及び皮を除く全ての部位を最初の水揚げまたは転載まで船上で保持すること) 及び漁獲データ提出が義務付けられており、2019 年の WCPFC では、2020 年 11 月以降、(ア) 水揚げまでヒレを胴体から切り離さない、または、(イ) 船上では切り離したヒレと胴体を同じ袋で保管する等の代替措置を講じる、ことが合意された。加えて、2014 年の WCPFC において、①マグロ・カジキ類を対象とするのはえ縄漁業は、ワイヤーリーダー (ワイヤー製の枝縄及びはりす) またはシャークライン (浮き玉または浮縄に接続された枝縄) のいずれかを




図8. 漁獲圧が南半球ニシネズミザメの MIST（個体群が維持可能な漁獲圧の上限に対応する管理基準値）を超える確率を年別に推定した結果（1960～2014年）

上から、大西洋南東部とインド洋南西部、インド洋南東部、太平洋南西部、南半球全体。1に近いほど、個体群への負の影響が大きい事を示す。Common Oceans (ABNJ) Tuna Project（2017）より引用。




図9. ICM（偶発的な漁獲量を考慮したモデル）によって推定されたニシネズミザメ北西系群の年別資源個体数（1961～2019年）
縦軸は個体数（単位は1,000個体）、実線は中央値、破線は80パーセンタイルを示す。ICCAT（2020）より引用。

使用しないこと（ワイヤーリーダーやシャークラインの詳細については、用語集を参照のこと）、②サメ類を対象とするはえ縄漁業は、漁獲を適切な水準に制限するための措置等を含む管理計画を策定すること、が合意された。IATTCでも、2016年の年次会合で、シャークラインの使用禁止を内容とする決議が採択され、2018年から義務付けられた。ICCATにおいては、2015年の年次会合において、ニシネズミザメが生きた状態で混獲された場合、速やかに放流を求める措置が合意された。

この他、ネズミザメに関しては、宮城県気仙沼を中心として

国内の水揚量・体長組成の収集を行い、モニターを継続している。ニシネズミザメに関しては、大西洋沿岸国において、国内措置として独自の資源評価に基づく漁獲量制限等が行われている。具体的には、EUは2010年から総漁獲可能量（TAC）を0に、カナダのニシネズミザメ対象漁業は2013年に終了し、ウルグアイでは2013年にニシネズミザメの保持が禁止された。一方で、本種を混獲物として扱う漁業国においては、生きて漁獲された個体の生存放流を推奨する他、混獲回避手段や漁獲死亡率を低減するための調査研究の推進が求められている。




図 10. ICM (偶発的な漁獲量を考慮したモデル) によって推定されたニシネズミザメ北西系群の個体数の将来予測結果 (2021~2071 年) 縦軸は B_{sprmer} (SPRmer に対応する資源量) に対する各年の資源量で、 B_t/B_{MSY} の代替として用いることができる。ベースケースに対して、年間の死亡数を 1,000 個体刻みで 0 から 24,000 個体まで増加させた場合に、個体数が 50 年間 (2.5 世代) にどのように変化するかを推定した。黒線は資源量が B_{MSY} となる点を示し、2019 年と 2020 年の死亡数は 2016~2018 年の平均値と仮定している。Anon.(ICCAT) 2020 より引用。SPRmer (spawning potential ratio at maximum excess recruitment) とは、加入尾数が最大となる状態における、加入当たりの産卵親魚尾数を意味する。MSY が重量ベースであるのに対し、SPRmer は尾数ベースでの基準値となる。

また、ニシネズミザメに関して、CITES 第 14 回締約国会議 (2007 年) と第 15 回締約国会議 (2010 年) で本種を附属書 II へ掲載する提案が相次いで出された。これらの提案はいずれも否決されたが、CITES 第 16 回締約国会議 (2013 年) において、EU を始めとする国々が再度本種を附属書 II に掲載する提案を提出し、投票の結果可決された。CITES は附属書 II に掲載することにより、本種の国際取引を透明化し漁業及び資源の管理に貢献することを目指しているが、国際取引が資源に悪影響を与えているという論拠がないことから、この制度がどこまで有効に機能するか注視していく必要がある。我が国は、商業漁業対象種の資源は、持続的利用の観点から、漁業管理主体である RFMO または沿岸国が適切に管理していくべき等との立場から、本種の附属書 II 掲載について留保している。

執筆者

かつお・まぐろユニット
かじき・さめサブユニット
水産資源研究所 水産資源研究センター
広域性資源部 まぐろ第 4 グループ
仙波 靖子

参考文献

Aasen, O. 1963. Length and growth of the porbeagle (*Lamna nasus*, Bonneterre) in the North West Atlantic. Fisk. Skrift. Ser. Havund., 13(6): 20-37.
Anon. (ICCAT) 2020. 5 Executive summaries on species. 5.4

POR-Porbeagle. In ICCAT (ed.), 2020 SCRS ADVICE TO THE COMMISSION (Madrid, Spain, 2020). 61-70 pp.

https://www.iccat.int/Documents/SCRS/SCRS_2020_Advice_ENG.pdf (2020 年 11 月 26 日)

Belleggia, M., Colonello, J., Cortés, F., and Figueroa, D.E. 2021. Eating catch of the day: the diet of porbeagle shark *Lamna nasus* (Bonnaterre 1788) based on stomach content analysis, and the interaction with trawl fisheries in the south-western Atlantic (52° S–56° S). J. Fish Biol., 99(5): 1591–1601. Doi: 10.1111/jfb.14864

Biais, G., Coupeau, Y., Séret, B., Calmettes, B., Lopez, R., Hetherington, S., and Righton, D. 2017. Return migration patterns of porbeagle shark (*Lamna nasus*) in the Northeast Atlantic: implications for stock range and structure. ICES J. Mar. Sci., 74: 1268-1276.

Cameron, L.W.J., Roche, W., Green, P., Houghton, J.D.R., and Mensink, P.J. 2018. Transoceanic movement in porbeagle sharks, *Lamna nasus*. Fish. Res., 207: 25-27.

Cameron, L.W.J., Roche, W., Houghton, J. D. R., and Mensink, P. J. 2019. Population structure and spatial distribution of porbeagles (*Lamna nasus*) in Irish waters, ICES J. Mar. Sci., 76(6):1581–1590. Doi: 10.1093/icesjms/fsz046

Campana, S.E., Joyce, W., and Fowler, M. 2010 Subtropical pupping ground for a cold-water shark. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 67: 769-773.

Campana, S., Joyce, W., Marks, L., Natanson, L., Kohler, N.,

- Jensen, C., Mello, J., Pratt, H.L.Jr., and Myklevoll, S. 2002. Population dynamics of the porbeagle in the northwest Atlantic Ocean. *N. Am. J. Fish. Manag.*, 22: 106-121.
- Campana, S., Marks, L., Joyce, W., Hurley, P., Showell, M., and Kulka, D. 1999. An analytical assessment of the porbeagle shark (*Lamna nasus*) population in the northwest Atlantic. *CSAS Res. Doc.* 99/158.
<http://uni.hi.is/scampana/files/2016/01/Porbeagle1999.pdf>
(2021年1月20日)
- Carlisle, A.B., Litvin, S.Y., Hazen, E.L., Madigan, D.J., Goldman, K.J., Lea, R.N., and Block, B.A. 2015. Reconstructing habitat use by juvenile salmon sharks links upwelling to strandings in the California Current. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 525: 217-228.
- Carlisle, A.B., Perle, C.R., Goldman, K.J., and Block, B.A. 2011. Seasonal changes in depth distribution of salmon sharks (*Lamna ditropis*) in Alaskan waters: implications for foraging ecology. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 68: 1905-1921.
- Coffey, D.M., Carlisle, A.B., Hazen, E.L., and Block, B.A. 2017. Oceanographic drivers of the vertical distribution of a highly migratory, endothermic shark. *Sci. Rep.*, 7: 10434.
- Common Oceans (ABNJ) Tuna Project. 2017. Southern Hemisphere porbeagle (*Lamna nasus*) stock status assessment. *WCPFC-SC13-2017/SA-WP-12(rev.1)*.
- Compagno, L.J.V. 2001. *FAO species catalog, Vol. 4: Sharks of the world; Part 2 - Bullhead, mackerel and carpet sharks.* Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, Italy. 269 pp.
- Conrath, C.L., Tribuzio, C.A., and Goldman, K.J. 2014. Notes on the reproductive biology of female salmon sharks in the eastern North Pacific Ocean. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 143: 363-368.
- Cortés, F., and Waessle, J.A. 2017. Hotspots for porbeagle shark (*Lamna nasus*) bycatch in the southwestern Atlantic (51° S-57° S). *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 74: 1100-1110.
- Francis, M.P., Campana, S.E., and Jones, C.M. 2007. Age underestimation in New Zealand porbeagle sharks (*Lamna nasus*): is there an upper limit to ages that can be determined from shark vertebrae? *Mar. Freshw. Res.*, 58: 10-23.
- Francis, M.P., Holdsworth, J.C., and Block, B.A. 2015. Life in the open ocean: seasonal migration and diel diving behaviour of Southern Hemisphere porbeagle sharks (*Lamna nasus*). *Mar. Biol.*, 162: 2305-2323.
- Francis, M.P., and Stevens, J.D. 2000. Reproduction, embryonic development, and growth of the porbeagle shark, *Lamna nasus*, in the southwest Pacific Ocean. *Fish. Bull.*, 98: 41-63.
- Garcia, S., Tribuzio, C.A., Seitz, A.C., Courtney, M.B., Nielsen, J.K., Murphy, J.M., and Oxman, D.S. 2021. Differential horizontal migration patterns of two male salmon sharks (*Lamna ditropis*) tagged in the Bering Sea. *Anim. Biotelemetry*, 9: 38.
Doi: 10.1186/s40317-021-00260-0
- Goldman, K.J., and Musick, J.A. 2006. Growth and maturity of salmon sharks (*Lamna ditropis*) in the eastern and western North Pacific, and comments on back-calculation methods. *Fish. Bull.*, 104: 278-292.
- González, M. T., Sepúlveda, F. A., Zárate, P. M., and Baeza, J. A. 2020. Regional population genetics and global phylogeography of the endangered highly migratory shark *Lamna nasus*: Implications for fishery management and conservation. *Aquatic Conserv: Mar Freshw. Ecosyst.*, 2020:1-15.
Doi: 10.1002/aqc.3455
- ICCAT. 2020. Report of The 2020 porbeagle shark stock assessment meeting.
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2020/REPORTS/2020_POR_SA_ENG.pdf (2021年12月12日)
- Jensen, C.F., Natanson, L.J., Pratt, H.L.Jr., Kohler, N.E., and Campana, S.E. 2002. The reproductive biology of the porbeagle (*Lamna nasus*) in the western North Atlantic Ocean. *Fish. Bull.*, 100: 727-738.
- Joyce, W.N., Campana, S.E., Natanson, L.J., Kohler, N.E., Pratt, H.L.Jr., and Jensen, C.F. 2002. Analysis of stomach contents of the porbeagle shark (*Lamna nasus* Bonnaterre) in the northwest Atlantic. *ICES J. Mar. Sci.*, 59: 1263-1269.
- 川崎 健・八百正和・安楽守哉・永沼 章・浅野政宏. 1962. 東北海区に分布する表層性肉食性魚類群集の構造とその変動機構について. 第1報. 東北区水産研究所研究報告, 22: 1-44.
- Kitamura, T., and Matsunaga, H. 2008. Population structure of Porbeagle (*Lamna nasus*) in the North Atlantic Ocean and SBT fishery ground as inferred from mitochondrial DNA control region sequences. *CCSBT-ERS/0909/08*. 8 pp.
- Kubodera, T., Watanabe, H., and Ichii, T. 2007. Feeding habits of the blue shark, *Prionace glauca*, and salmon shark, *Lamna ditropis*, in the transition region of the Western North Pacific. *Rev. Fish Biol. Fisher.*, 17: 111-124.
- 松永浩昌・仙波靖子・余川浩太郎. 2012. ミナミマグロ漁場で漁獲される主要な外洋性サメ類3種のCPUEの経年変化の更新(1992-2010). *CCSBT-ERS 提出文書*.
- 森信 敏. 1996. ミナミマグロ漁場におけるネズミザメ科魚類2種の分布と年齢・成長に関する研究. 平成7年度東海大学大学院海洋学研究科修士論文. (1) + 25 pp. + 11 tables + 46 figs.
- 中野秀樹. 1996. 北太平洋における外洋性板鰐類の分布. *月刊海洋*, 28: 407-415.
- Nakano, H., and Honma, M. 1996. Historical CPUE of pelagic sharks caught by Japanese longline fishery in the Atlantic Ocean. *Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT*, 46(4): 393-398.
https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV046_1997/n_4/CV046040393.pdf (2021年1月20日)
- Natanson, L.J., Deacy, B.M., Joyce, W., and Sulikowski, J. 2019. Presence of a resting population of female porbeagles (*Lamna nasus*), indicating a biennial reproductive cycle, in the western North Atlantic Ocean. *Fish. Bull.*, 117: 70-77.
- Natanson, L.J., Mello, J.J., and Campana, S.E. 2002. Validated age and growth of the porbeagle shark (*Lamna nasus*) in the western North Atlantic Ocean. *Fish. Bull.*, 100: 266-278.
- Pade, N.G., Queiroz, N., Humphries, N.E., Witt, M.J., Jones, C.S.,

- Noble, L.R., and Sims, D.W. 2009. First results from satellite-linked archival tagging of porbeagle shark, *Lamna nasus*: area fidelity, wider-scale movements and plasticity in diel depth changes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 370: 64-74.
- Pons, M., and Domingo, A. 2009. Standardized CPUE of porbeagle shark (*Lamna nasus*) caught by Uruguayan pelagic longline fleet (1982-2008). ICCAT/SCRS/2009/093.
- 佐野 蘊. 1960. 海洋におけるサケ・マス为天敵ネズミザメに関する1959年の調査. 北海道区水産研究所研究報告, 22: 68-72.
- 佐野 蘊. 1962. 海洋におけるサケ・マス为天敵ネズミザメに関する1960年の調査. 北海道区水産研究所研究報告, 24: 148-162.
- Saunders, R.A., Royer, F., and Clarke, M.W. 2011. Winter migration and diving behavior of porbeagle shark, *Lamna nasus*, in the Northeast Atlantic. ICES J. Mar. Sci., 68: 166-174.
- Semba, Y., Yokawa, K., Matsunaga, H., and Shono, H. 2013. Distribution and trend in abundance of the porbeagle (*Lamna nasus*) in the Southern Hemisphere. Mar. Freshw. Res., 64: 518-529.
- Skomal, G., Marshall, H., Galuardi, B., Natanson, L., Braun, C.D., and Bernal, D. 2021. Horizontal and vertical movement patterns and habitat use of juvenile porbeagles (*Lamna nasus*) in the western North Atlantic. Front. Mar. Sci., 8: 624158. Doi: 10.3389/fmars.2021.624158
- 水産庁(編). 1993-1997. 平成4年度-平成8年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京.
- 水産庁(編). 1998-2001. 平成9年度-平成12年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書-II(別冊資料: まぐろ類等漁獲実態調査結果). 水産庁, 東京.
- 水産研究・教育機構(編). 2017-2018. 平成28年度-平成29年度 国際漁業資源評価調査・情報提供事業 現場実態調査報告書. 水産研究・教育機構, 横浜.
- 水産研究・教育機構(編). 2019-2020. 平成30年度-平成31年度 水揚げ地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜.
- 水産研究・教育機構(編). 2021. 令和2年度 水揚げ地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜.
- 水産総合研究センター(編). 2002-2006. 平成13年度-平成17年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター(編). 2007. 平成18年度 日本周辺国際魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター(編). 2008-2011. 平成19年度-平成22年度 日本周辺国際魚類資源調査報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター(編). 2012-2016. 平成23年度-平成27年度 水揚げ地でのまぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜.
- 田中 彰. 1980a. 北太平洋北西海域におけるネズミザメの生態学的研究. 東京大学大学院農学研究科博士論文. IV + 206 pp.
- 田中 彰. 1980b. 北太平洋北西海域におけるネズミザメの生物調査. In 海洋水産資源開発センター(編), 昭和54年度さめ新資源開発調査報告書(北太平洋海域). 海洋水産資源開発センター, 東京. 59-84 pp.
- WCPFC. 2017. The commission for the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean. Thirteenth Regular Session of the Scientific Committee. Summary Report.
- Weng, K.C., Castilho, P.C., Morrisette, J.M., Landeira-Fernandez, A.M., Holts, D.B., Schillers, R.J., Goldman, K.J., and Block, B.A. 2005. Satellite tagging and cardiac physiology reveal niche expansion in salmon shark. Science, 310(5745): 104-106.
- Weng, K.C., Foley, D.G., Ganong, J.E., Perle, C., Shillinger, G.L., and Block, B.A. 2008. Migration of upper trophic level predator, the salmon shark *Lamna ditropis*, between distant ecoregions. Mar. Ecol. Prog. Ser., 372: 253-264.
- Wourms, J.P. 1977. Reproduction and development in chondrichthyan fishes. Amer. Zool., 17: 379-410.
- 谷津明彦. 1995. 南太平洋における外洋性表層魚類の生物地理学的研究、特にアロツナス *Allothunnus fallai* の生態的役割について. 遠洋水産研究所研究報告, 32: 1-145.

ネズミザメ（北太平洋）の資源の現況（要約表）

資源水準	調査中
資源動向	横ばい
世界の漁獲量 (最近5年間)	調査中
我が国の漁獲量 (最近5年間)	1,939～3,549 トン（水揚げ量） 最近（2020）年：2,690 トン 平均：3,031 トン（2016～2020 年）
管理目標	検討中
資源評価の方法	未実施
資源の状態	調査中
管理措置	漁獲物の完全利用等
管理機関・関係機関	ISC、WCPFC
最近の資源評価年	実施されていない
次回の資源評価年	未定

ニシネズミザメ（北太平洋・南半球）の資源の現況（要約表）

海域	北西大西洋	北東大西洋	南西大西洋	南東大西洋	その他南半球
資源水準	低位	低位	調査中	調査中	調査中
資源動向	増加	調査中	調査中	調査中	調査中
世界の漁獲量 （最近 5 年間） （2016～2020 年）	14～47 トン 最近（2020）年：14 トン 平均：28 トン		0～4 トン 最近（2020）年：0 トン 平均：2 トン		調査中
我が国の漁獲量 （最近 5 年間） （2016～2020 年）	0～2 トン 最近（2020）年：0 トン 平均：0 トン		0 トン 最近（2020）年：0 トン 平均：0 トン		0～8.3 トン 最近（2020）年：0 トン 平均：4.3 トン
管理目標	MSY				検討中
資源評価の方法*1	ICM 及び ERA（SAFE アプローチ）による解析	BSPM 及び ASPM に よる解析	ERA（SAFE アプローチ）による 解析		MIST によるリスク評価
資源の状態	B ₂₀₁₈ / B _{MSY} : 0.57 F ₂₀₁₀₋₂₀₁₈ / F _{MSY} : 0.413	B ₂₀₀₈ / B _{MSY} : 0.09-1.93*2	B ₂₀₁₈ / B _{MSY} : 不明 F ₂₀₁₀₋₂₀₁₈ / F _{MSY} : 0.113		調査中
管理措置	・ 漁獲物の完全利用等 ・ 生きた状態で混獲された場合の放流義務 ・ その他、沿岸国における以下の国内規制あり；国内漁獲量制限（米国：11.3 トン、EU：0 トン、ウルグアイ：0 トン）、対象漁業の禁止（カナダ）、水揚げサイズ規制（EU：尾叉長 210 cm まで）				漁獲物の完全利用等
管理機関・関係機関	ICCAT、NAFO、CITES	ICCAT、ICES、 CITES	ICCAT、CCSBT、CITES		ICCAT、IOTC、WCPFC、 IATTC、CCSBT、CITES
最近の資源評価年	2020 年	2009 年	2020 年		2017 年
次回の資源評価年	未定	2022 年	未定		予定なし

^{*1} BSPM（Bayesian Surplus Production Model）：ベイジアンサーブラスプロダクションモデル、ASPM（Age-Structured Production Model）：年齢構成を考慮したプロダクションモデル、ICM（Incidental Catch Model）：偶発的な漁獲量を考慮したモデル、ERA（Ecological Risk Assessment）：生態学的リスク評価、SAFE（Sustainability Assessment for Fishing Effects）：漁業活動に対する持続可能性分析、MIST（Maximum Impact Sustainable Threshold）：個体群が維持可能な漁獲圧の上限に対応する管理基準値。

^{*2} 1.93 は生物学的に非現実的なシナリオに基づく推定値に対応し、これを除いた場合のレンジは 0.29～1.05。