カラスガレイ 北西大西洋

(Greenland Halibut *Reinhardtius hippoglossoides*)

(Fisheries and Oceans Canada)

管理・関係機関

北西大西洋でカラスガレイを管理しているのは北西大西洋漁業機関 (NAFO) である。NAFO は 1979 年に発足したが、それ以前は北西大西洋漁業国際委員会 (ICNAF; 1949 年発足) がカラスガレイを含む水産資源の管理をしていた。図 1 は NAFO 条約海域 (Convention Area) で、EEZ (オレンジ色) 及び管轄海域 (Regulatory Area、空色) (公海域) である。EEZ には、カナダ、デンマーク (グリーンランド)、仏領サンピエール島・ミクロン島及び米国が含まれる。管轄海域とは実際の管理が及ぶところである。NAFO 条約海域のカラスガレイには南北 2 系群があり、南系群は NAFO 統計海域 2+3 (図 2)、北系群はそれ以北のカナダ・グリーンランドの EEZ に生息する資源である。日本の TAC 割当があるのは南系群なので、本稿では主にこの系群に関する情報をまとめた。尚、図 2 に NAFO 条約海域南部における統計海域 (コード) を示した。

最近の動き

NAFO 条約海域では我が国の着底トロール船 1 隻が管轄海域 (3LMNO; 図 2) で操業している。2021 年の作業部会・科学理事会・年次会合は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのため、全て Web 会合で実施された。そのため緊急性・重要性のある議題に絞られた。我が国の最重要魚種であるカラスガレイ TAC は、管理戦略評価 (MSE) に基づく漁獲管理ルール (Harvest Control Rule: HCR) で決定されており、2021 年と 2022 年の TAC はそれぞれ 16,498 トン (日本割当 1,253 トン) と 15,864 トン (同 1,205 トン) で、2022 年の TAC は前年に比べ全体で 634 トン減 (日本 48 トン減) となった。サンゴ・海綿保護禁漁海域の見直しは、当初予定より 1 年遅れ、2021 年に実施された。

利用・用途

食用として生鮮及び冷凍で販売され、惣菜 (煮つけ、ムニエル、ソテー、唐揚げ、刺身) や寿司ネタとして利用されている。

漁業の概要

カラスガレイは NAFO 条約海域では主に着底トロールで漁

図 1. NAFO 条約海域 (Convention Area) = EEZ 内 (オレンジ色) + 管轄海域 (Regulatory area; 空色の公海域) カラスガレイ資源には南北 2 系群がある。

図 2. (図 1 赤枠詳細図) NAFO 条約海域南部の統計海域 カラスガレイ (南系群) 操業域 = 海域 2+3K (カナダ EEZ 内) + 3LMNO (公海域)

獲されている。NAFO 条約海域の南系群操業域 (2+3KLMNO) における国別漁獲量 (1960~2020 年) を図3・付表1に示した (NAFO STATLANT 21A)。1974 年 TAC 設定後の国別漁獲量は、TAC 未消化ないしオーバーが頻繁にあったものの、国別 TAC 値に大きく左右されている (国別 TAC に関しては「管理方策」の項参照)。

1959 年以前の漁獲量は NAFO データベースにはないが、国際連合食糧農業機関 (FAO) 漁獲統計 (FAO 2020) によると、1950~1959 年において北西大西洋全域では 500 トンから 1,700 トンへと増加傾向となっている。大半の漁獲量は、デンマーク (グリーンランド) による漁獲であった。その間の全域の平均漁獲量は 840 トンで、それ以降 60 年間 (1960~2019 年) の平均漁獲量 (48,600 トン) の 1.7%に相当し、極めて低いレベルであった。

本格的な漁業が開始したのは 1964 年 (4,300 トン) からで、漁獲量は 7 年後の 1970 年に 3.7 万トンとなり 9 倍近く急増した。その後、3 回の大きな漁獲量のピークを除き増減はあるものの、全体に減少傾向で現在に至っている。第 1 回目のピーク①は 1978~1980 年の 3 年間で平均漁獲量は 3.5 万トン、2 回目のピーク②は 1992~1994 年の 3 年間で平均 5.4 万トン、3 回目のピーク③は 2000~2003 年の 4 年間で平均 3.2 万トンであった (図 3)。最近 5 年間 (2016~2020 年) の平均漁獲量は 1.5 万トンで、3 回のピーク時平均漁獲量の 48%程度と低いレベルにある。第 2 回目 (1992~1994 年) ピーク②における平均漁獲量が過去最大 (5.4 万トン) となったが、その背景は以下の通りである。第 2 回ピーク時②前の 1986~1989 年に高い TAC (10 万トン) が設定されたが、平均 22%しか消化されなかったため、その直後の第 2 回ピーク時②にスペイン・ポルトガルが急激な漁場開発を行い、漁獲量が急増した。

国別漁獲量は、ICNAF 管轄の 19 年間 (1960~1978 年) では、カナダ (対全漁獲量比 42%)、ソ連 (24%)、ポーランド (20%)、東ドイツ (10%) の順で多く、4 か国を合わせると全漁獲量の 96%を占めた。NAFO 発足以降の 42 年間 (1979~2020 年) では、カナダ以外の漁業国が一変し、この間の全

図 3. NAFO 条約海域 2+3KLMNO におけるカラスガレイ漁獲量 (1960~2020 年) (NAFO 2020)

ソ連は 1991 年まで、1992 年以降ロシア。東ドイツは 1990 年まで、それ以降 (統一) ドイツの操業はない。その他 (累積漁獲量順) : フェロー諸島、西ドイツ (1990 年まで)、仏領サンピエール島・ミクロン島、ノルウェーほか。①、②及び③は、3 回の漁獲量ピーク年を示す。

漁獲量の多い国はカナダ (38%)、スペイン (28%)、ポルトガル (14%)、日本 (5%)、ロシア (5%) の順で、この 5 か国を合わせると全漁獲量の平均 90%を占めている。

日本は NAFO 管轄海域で 1978 年に操業を開始し、翌 1979 年と経済的理由で操業船がなく休漁した 2009~2015 年の 7 年間以外、2021 年までに 36 年間カラスガレイの漁獲実績がある。カラスガレイは主に着底トロールで漁獲されており、操業船数は 1978~1992 年 (14 年間) 2~20 隻、1993~2003 年 (11 年間) 2 隻、2004~2021 年 (休漁年を除く 11 年間) 1 隻であった。

生物学的特性

【分類】

カラスガレイは漢字で烏鰈、学名は *Reinhardtius hippoglossoides*、代表的英名は Greenland halibut である。カラスガレイはスズキ系カレイ目カレイ亜科カレイ科の海水魚で、本種が属するカラスガレイ属は本種一種のみの単型属である。

【形態】

カラスガレイの左目は成長と共に頭部右側に移動するが前方への視界もある。表面は斑点の見られる褐色だが、左側はやや色が薄いものの白色ではない。ソウハチのように左目の位置が背側正中線上にあり一つ目のような感があり、他の目の位置が完全に移動しているヒラメやカレイ等と比べ、広い範囲の視界を有していると思われる。体形は細長く背側から腹側に向けて潰されたようであり、筋肉は両面とも同様に発達している。両面に色素があり、裏面にあたる左側は表面に比べて色が若干薄い。

【分布】

図 4 に世界のカラスガレイ分布域 (茶色) を示した。北半球の太平洋・大西洋北部沿岸域に分布する。NAFO 条約海域 (オレンジ色) では、カナダ・グリーンランドの沿岸域南北方向 (北緯 39~76 度) に広く分布している。カラスガレイは水深 200~2,200 m、多くは水深 500~1,000 m の主に沿岸域に生息する深海魚で、水温は-1~4℃の海域を好むが、-2.1℃の水域で生息が確認されたという報告もある。

図 4. 世界のカラスガレイ分布域 (茶色) (北半球の太平洋・大西洋沿岸域に生息)

NAFO 条約海域 (オレンジ色) では南北に長く (北緯 39~76 度)、南北 2 系群 (境界: 北緯 60 度付近、点線) が分布している。

【系群構造】

NAFO 条約海域におけるカラスガレイの産卵場は北部と南部に各1か所にあり、海況の影響で南北のカラスガレイの交流が少ない。このことは標識の再捕の結果（南北の移動が少ない）からも明らかになっている。そのため、系群構造は南北2系群あると考えられており（図4）、カラスガレイの資源評価もそれぞれの系群域で実施されている。

【寿命】

最大寿命は雄17歳（体長70cm）、雌33歳（109cm）という研究例がある。資源評価では10歳以上をPlus groupとして取り扱う。体長は下顎先端～尾鰭基底の長さ。

【体長・体重関係】

年別（1990～1997年）・海域別（2+3KLMNO）・雌雄別の体長・体重関係係数が推定されているが、平均的関係係数（雌雄込）は下記の通りである（Gundersen and Brodie 1999）。

$$W = 5.3431 \times 10^{-6} \times L^{3.158}$$

L：体長（下顎先端～尾鰭基底 cm）、W：全重量（kg）

【成長】

耳石の放射性炭素による年齢査定に基づく成長式は下記の通りで（Dwyer *et al.* 2016）、von Bertalanffy の成長式 $L_t = L_\infty (1 - e^{-K(t-t_0)})$ による推定である。Lt は t 歳の体長、 L_∞ は最大体長、K は成長率、 t_0 は理論上体長が0になる年齢。体長は下顎先端～尾鰭基底の長さ。

$$\text{雄： } L_t = 90 (1 - e^{-0.09(t-0.05)})$$

$$\text{雌： } L_t = 109 (1 - e^{-0.09(t-0.05)})$$

【成熟・産卵】

50%成熟年齢：雄9～10歳、雌12～13歳

50%成熟体長：雄57～61cm、雌74～82cm

産卵期：周年（夏・秋に多い）

産卵場：グランドバンク及びフレミッシュパス（海域3LM）

【索餌】

索餌活動は、最も浅い層（700～900m）では秋（10～11月）に活発になる。より深い層では季節性は確認されていない。索餌場はグランドバンク及びフレミッシュパス（海域3LM）で、採餌活動は中深海で行われる。

【食性】

中深層から漸深層に生息する魚類（タラ、ゲンゲ、シシャモ、アカウオ等の幼魚）、甲殻類（エビ等）、頭足類（主にイカ）等。

【捕食者】

シャチ等。

資源状態

最新の資源評価は2020年6月の科学理事会で実施された。本資源評価の目的は、現在TAC決定に使用されているMSEの

パフォーマンスをレビューすることである（MSEの詳細は次節参照）。資源評価はMSEのオペレーティングモデル（OM）で使用されている「統計的年齢別漁獲尾数モデル」（Statistical Catch-at-Age Model：SCAA）及び「拡張型SCAA状態空間モデル」（SAM Style assessment Model：SSM）により実施された。尚、本資源評価はMSEのOMで合意されたベースケースを用いて行われた。表1に両者の主な仕様と資源評価の結果を比較しまとめた。図5に両者の神戸プロットを示した（1975～2019年）。Bは漁獲対象（5～9歳）の資源量。2019年の資源状態は両者共にイエローゾーン（資源量は乱獲状況であるがF（漁獲死亡係数）がMSY（最大持続生産量）を達成するレベル以下でやや回復傾向）である。両者の大まかな資源状況変遷傾向は似ているが、細かい動きは異なる。その理由は、表1に示したように両モデルの異なる仕様（特に親子関係の有無）によるものと考えられている（NAFO 2020、西田 2020）。

管理方策**(1) MSE****【概要】**

カラスガレイの最重要管理方策は、MSEの枠組みで設定されたHCRによるTAC決定である。2010年以前は、資源評価によりTACが決定されたが、2011年よりMSEに基づくHCRを用いるようになった。その理由は以下の通り。従来のTAC決定は一回の資源評価結果に基づくスナップショット的な方法によるものであった。これに対しMSEは、「管理目標達成」、「情報・モデルに起因する不確実性」、「変動の少ない安定したTAC値」、「TAC値を最大にする」等の重要な要因を長期間に渡り包括的に考慮した産学官にとって有効かつ効果的な管理手法だからである。初版MSEは2011～2017年、現行第2版は2018～2023年のTAC決定に運用されている。

MSEは「管理目標」を最も高い確率で達成可能にする「管理方策」を種々の候補からOMによる将来予測（シミュレーション）で評価・決定し、それを反映したHCRでTACを決定する管理手法である。第2版の「管理目標」は「漁獲対象資源量を2037年までに B_{MSY} レベルに回復する」である。管理方策は「初年度（2018年）TAC値」、「TAC最大変動幅」、「最適なCPUE」ほかで、それぞれ幾つかの候補を設定し組み合わせ、どの組合せの場合最も高い確率で「管理目標」を達成できるかを、2種のOM（SCAAとSSM）を用いた将来予測により評価し決定した。各OMには、資源評価を実施する際に考えらえる現実的シナリオ（親子関係、スティーブネス、自然死亡係数、加入量ほか）8種類を設定し、どのシナリオの時最も高い確率で「管理目標」を達成できるかも同時に評価した。その結果、管理目標を最も高い確率で達成できる「管理方策」は、「初年度（2018年）TAC 1.65万トン」、「TAC変動幅±10%以下」、「調査CPUE5種の使用」であることが判明した。これは、2種OMのSCAA（5シナリオ）及びSSM（4シナリオ）で確認された。本「管理方策」を実行するため、調査CPUEに基づくHCRが合意され、TAC値が毎年決定されている（NAFO 2018、西田 2018）。

表1. 資源評価に用いられた2種モデル (SCAA・SSM) の仕様・結果 (ベースケース) 比較 (NAFO 2020c)

比較項目	SCAA	SSM
	(英名)	Statistical-Catch-At-Age
(和名)	統計的年齢別漁獲尾数モデル	(拡張型)統計的年齢別漁獲尾数 状態空間モデル
誤差	観測誤差 (データに起因する誤差)	観測誤差+プロセス誤差 (モデルとデータに起因する誤差)
年齢	漁獲対象年齢(5~9歳)+ プラスグループ(10歳以上)	
漁獲量	科学理事会推定値	
CPUE	カナダ・EUの調査CPUE(5種)	
親子関係	Beverton and Holt	使用しない (無いと仮定)
成熟年齢	10歳以上	
ステイブネス	0.8	
自然死亡係数	0.12	
(実施国)	日本	カナダ
(担当者)	バターワース・レデメア (南ア)	レギュラー(カナダ)
神戸プロット	図5	
B ₂₀₁₉ (千トン)	71	68
B ₂₀₁₉ /B _{MSY}	0.60	0.68
F ₂₀₁₉	0.23	0.18
F ₂₀₁₉ /F _{MSY}	0.95	0.52
加入量 (百万尾)	81	66

(注1) SAMはSCAA implemented State-space stock Assessment Model (拡張型SCAA 状態空間モデル)。観測・プロセスエラー両誤差を考慮した柔軟なモデルで、計算の負担が少ない。

(注2) SCAAは年齢別漁獲量(Catch-At-Age:CAA)に基づく資源評価手法で、コホート解析(Virtual Population Analysis:VPA)もその一つである。VPAはCAAを正確な情報として固定し取り扱うが、SCAAではCAAを統計的に取り扱うので、より現実的な推定値が得られる。

(注3) Bは漁獲対象(5~9歳)資源量。

(注4) 加入量の指標はSCAAで0歳魚、SSMで1歳魚の資源量。

図5.SCAA(左)とSSM(右)による資源評価結果に基づく神戸プロット(1975~2019年)(NAFO 2020より改訂)

【MSEの予測の検証】

6年のMSE運用期間の中期3年目にあたる2020年6月の科学理事会で中期レビューとして資源評価を実施し、資源動態やMSEの予測が正常であるか点検された。その結果、SCAAでは2017年に5~9歳の平均自然死亡係数が予測値の95%信頼区間を少し下回ったが、2018年と2019年は80%以内に収まり、また、漁獲対象資源量及び加入量はいずれの年も予測値の80%以内に収まった(図6)。一方、SSMではこれら3つの資源評価指標値がそれぞれの予測値の95%以内に収まった。この結果、総合的にみて将来予測が正常に運用されていると判

断された(NAFO 2020)。資源評価は運用期間の最終年(2023年)にも実施される。

【例外的な状況の発生】

MSEがHCRにより正常に運用されているか検討するため、上述の資源評価の実施のほか、毎年「例外的な状況」(Exceptional Circumstances:EC)が発生していないかを点検することが合意されている(NAFO 2018年次会合)。ECに対処する点検項目プロトコル(調査欠測、CPUE、漁獲量、加入量等の異常値の判定方法)が採択されており、極端な場合(EC

図 6. 2020 年の資源評価に基づく SCAA による加入量（百万尾）、漁獲対象資源量（千トン）及び 5～9 齢の平均漁獲死亡係数 F（黒線）と 2017 年の MSE による各指標の予測中央値（青線）と予測範囲（各図灰色青線）との比較（NAFO 2020）
右はそれぞれ一部を拡大したもの。

が多発し、その度合いが深刻な場合）には、MSE の使用を中止し改善した MSE により運用することになっている（NAFO 2018、2022、西田 2019）。2021 年の場合、EU による 3M 区における底魚トロール調査（EU 3M0-1400m）の 2020 年 CPUE 値が両 OM の予測値の 95%信頼区間下限を少し下回ったが（図 7；SCAA の例）、それ以外の 4 調査では 2017～2020 年の CPUE 値が両 OM とも 95%信頼区間に収まり、またその他の点検項目プロトコルも異常がなく、総合的に EC の発生はなかったと判断された（NAFO 2021）。

(2) TAC 国別割当

カラスガレイ南系群操業海域（海域 2+3KLMNO；図 2）の国別 TAC 割当は以下のように 2 段階で設定されている。第 1 段階の割当として、「カナダ領海域（海域 2+3K の EEZ）」と「管轄海域（海域 3LMNO の公海域）」で、それぞれ 25.9%及び 74.1%となっている。また第 2 段階割当は「管轄海域の国別 TAC 割当枠」で、日本枠は 74.1%の中の 10.25%で全 TAC 枠の 7.60%となっている。2021 年の科学理事会では、HCR に基づく計算の結果、2022 年の TAC は全体で 15,864 トンとなり、このうち日本には 1,205 トンが配分された（NAFO 2021）。

(3) VME 保護海域

NAFO 憲章は「資源の持続的利用」と「生態系保全」の調和

図 7. Exceptional Circumstances (EC) 発生の有無確認のための 5 つの調査の CPUE 値（左列及び右列上中図）及び CPUE コンポジット指標（右下図）と SCAA による予測範囲（各図灰色）との比較（NAFO 2021）

を最重要目標としており、特に最近は国連の動きを反映し「生態系保全」が重要視されている。そのため「公海深海漁業管理のための国際ガイドライン」(FAO 2009)に記載されている「脆弱な海洋生態系」(Vulnerable Marine Ecosystems: VME)の指標種であるサンゴ類・海綿類を保全するための禁漁海域が重要な管理方策となっている。2021年時点で3LMN区に計13か所の禁漁海域が設置されていたが、同年のNAFOの本委員会で見直しが行われ、2022年以降同域で7か所の禁漁域が拡大するとともに2か所の新規の禁漁域が設置されることになった。また、禁漁海域以外でVME指標種と遭遇し既定の閾値(重量)を超えた場合、その地点から少なくとも2海里離れることが義務付けられており、既存漁場外の場合はその地点から半径2海里の円形海域を暫定的に禁漁海域とする規定がある(ムーブオンルール)(NAFO 2022)。

(4) その他

その他重要な管理方策として、混獲・投棄規制、漁獲体長最小規制(30 cm)、網目規制(130 mm)等がある(NAFO 2022)。

執筆者

水産資源研究所 水産資源研究センター
 広域性資源部 外洋資源グループ
 瀧 憲司

参考文献

Dwyer, K.S., Treble, M.A., and Campana, S.E. 2016. Age and growth of Greenland halibut (*Reinhardtius hippoglossoides*) in the Northwest Atlantic: A changing perception based on bomb radiocarbon analyses. *Fish. Res.*, 179: 342–350.

FAO. 2009. International guidelines for the management of deep-sea fisheries in the high seas. FAO, Rome, Italy. 92 pp.

FAO. 2020. FishStatJ. Software for Fishery and Aquaculture Statistical Time Series (Version 4.00.16). Rome. Italy. <http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en> (2021年1月12日)

Gundersen, A.C., and Brodie, W.B. 1999. Length-weight relationships of Greenland halibut in NAFO Divisions 2GHJ and 3KLMNO, 1990-97. NAFO SCR Doc. 99/31, Ser. No. N4087. NAFO STATLANT 21A <https://www.nafo.int/Data/STATLANT> (2021年9月15日)

NAFO. 2018. Report of the NAFO Commission and its Subsidiary Bodies (STACTIC and STACFAD). NAFO/COM. Doc. 18-28.

NAFO. 2020. Report of the Scientific Council Meeting. (28 May -12 June 2020), NAFO SCS Doc. 20/14.

NAFO. 2021. Report of the Scientific Council Meeting (27 May -

11 June 2021), NAFO SCS Doc. 21/14.

NAFO. 2022. Conservation and Enforcement Measures 2022. COM DOC 22-01.

西田 勤. 2018. NAFO・SEAFO・SIOFA 事業報告書 (2017年度) (No. 17). 水産庁 増殖推進部 漁場資源課 国際資源班 国際漁業資源評価調査・情報提供委託事業 (外洋資源ユニット 外洋底魚サブユニット). 150 pp.

西田 勤. 2019. NAFO・SEAFO・SIOFA 事業報告書 (2018年度) (No. 18). 水産庁 増殖推進部 漁場資源課 国際資源班 国際漁業資源評価調査・情報提供委託事業 (外洋資源ユニット 外洋底魚サブユニット). 133 pp.

西田 勤. 2020. NAFO・SEAFO・SIOFA 事業報告書 (2019年度) (No. 19). 水産庁 増殖推進部 漁場資源課 国際資源班 国際漁業資源評価調査・情報提供委託事業 (外洋資源ユニット 外洋底魚サブユニット). 134 pp.

カラスガレイ (北西大西洋) の資源の現況 (要約表) *

資源水準	低位
資源動向	横ばい
NAFO 海域における世界の漁獲量 (最近5年間)	13,000~16,300 トン 最近 (2020) 年: 16,100 トン 平均: 15,230 トン (2016~2020年)
我が国の漁獲量 (最近5年間)	509~1,219 トン 最近 (2020) 年: 1,219 トン 平均: 992 トン (2016~2020年)
管理目標	2037年までにB (漁獲対象資源) を B_{MSY} レベルに回復 (MSEの管理目標)
資源評価の方法	統計的年齢別漁獲尾数モデル (SCAA) 及び拡張型 SCAA 状態空間モデル (SSM)
資源の状態	神戸プロット黄色ゾーン $B < B_{MSY}$ (乱獲) $F < F_{MSY}$ (適正) Bは漁獲対象 (5~9歳) 資源量
管理措置	MSEの枠組みで設定されたHCR、混獲・投棄規制、漁獲体長最小規制 (30 cm)、網目規制 (130 mm) ほか
管理機関・関係機関	NAFO
最近の資源評価年	2020年
次回の資源評価年	2023年 (2022年までのデータによる資源評価)

* NAFO 条約海域の南系群 (統計海域 2+3KLMNO) に関する内容。2020年までのデータによる資源評価。

付表 1. NAFO 条約海域南系群の操業域 (2+3KLMNO) における国別漁獲量 (トン) (NAFO 2020)

(注1) 空白は操業なし。0はカラスガレイ漁獲なし、または操業なし(どちらか不明なため)
 (注2) (斜線) 1991年までソ連、1992年以降ロシアに国名が変更
 (注3) (斜線) 1990年まで東ドイツ、1991年以降(統一)ドイツに国名変更(操業なし)

管理機関	年	カナダ	スペイン	ポルトガル	ソ連	ポーランド	東ドイツ	日本	ロシア	その他	合計
北西大西洋 漁業国際委 員会(ICNAF) (1949~ 1978)	1960	660								278	938
	1961	741									741
	1962	586								2	588
	1963	776				144	691			10	1,621
	1964	1,757				626	1,834			35	4,252
	1965	8,082				1,040	947			0	10,069
	1966	16,226				253	1,118	1,324		355	19,276
	1967	16,608				5,139	3,321	1,415		42	26,525
	1968	13,353				9,107	5,806	4,122		4	32,392
	1969	11,556				9,988	5,416	10,034		281	37,275
	1970	10,711				7,683	8,266	9,221		1,008	36,889
	1971	9,410				9,268	5,238	909		9	24,834
	1972	8,952		3		10,304	6,987	402		3,390	30,038
	1973	6,848			241	8,716	9,065	1,681		2,554	29,105
	1974	5,757			190	9,650	7,105	2,701		2,185	27,588
	1975	7,814			275	9,439	8,447	2,025		814	28,814
	1976	9,314		1	73	6,799	5,942	1,512		971	24,612
	1977	17,973			177	4,309	6,006	1,953		1,630	32,048
1978	24,702				5,632	5,215	1,636	3	1,882	39,070	
北西大西洋 漁業機関 (NAFO) (1979~)	1979	29,965	5	42	1,961	1,813	178			141	34,105
	1980	31,834		72	277	203	320	12		149	32,867
	1981	24,180		16	3,339	1,806	1,350	60		3	30,754
	1982	19,309		1,818	1,472	1,111	2,487	14		67	26,278
	1983	17,127		1,918	937	5,258	2,590	1		30	27,861
	1984	17,297		2,612	447	943	2,498	1,013		63	24,873
	1985	12,313		2,940	149	460	1,850	271		847	18,830
	1986	8,216		3,107	776	177	1,868	1,315		480	15,939
	1987	13,451	108	1,832	6,718	1,001	3,268	2,162		2,878	31,418
	1988	8,467	18	4,194	1,065	904	2,246	1,534		787	19,215
	1989	11,995	18	3,616	1,059	360	1,727	530		729	20,034
	1990	9,167	1,730	11,171	1,313		12	1,666		1,523	26,582
	1991	6,739	6,653	13,961	2,753			2,038		2,397	34,541
	1992	7,003	34,520	10,547				4,674	22	1,056	57,822
	1993	4,906	35,640	8,811				2,920		414	52,691
	1994	2,953	40,772	5,970				1,179	89	72	51,035
	1995	3,235	8,608	1,942				1,777	381	14	15,957
	1996	6,179	7,309	3,313				2,032	311	55	19,199
	1997	6,280	7,945	3,347				1,876		432	19,880
	1998	4,121	7,236	3,245				2,053	1,890	1,448	19,993
	1999	4,073	9,027	3,997				2,420	3,117	1,836	24,470
	2000	10,651	9,547	4,688				2,512	3,335	1,959	32,692
	2001	8,368	11,572	5,027			44	2,815	3,773	2,001	33,600
	2002	6,292	12,826	4,318				2,782	3,278	1,286	30,782
	2003	6,635	12,340	4,369				2,519	3,005	1,780	30,648
	2004	4,904	5,082	1,888				1,416	1,680	2,128	17,098
	2005	6,644	5,491	2,256				1,337	1,590	467	17,785
	2006	6,375	5,301	2,326				1,405	1,531	774	17,712
	2007	5,337	4,588	1,873				1,223	1,507	821	15,349
	2008	4,864	4,598	1,976				1,219	1,543	844	15,044
	2009	5,754	4,528	2,075					1,615	697	14,669
	2010	6,526	4,584	2,257					1,514	919	15,800
2011	6,165	4,679	2,493					1,627	951	15,915	
2012	6,176	4,694	2,051					1,543	944	15,408	
2013	6,403	4,328	2,124					1,469	1,182	15,506	
2014	7,289	4,176	1,938					1,411	849	15,663	
2015	6,569	4,245	1,722					1,472	1,017	15,025	
2016	4,409	4,093	1,583				509	1,398	1,044	13,036	
2017	5,362	4,079	1,920				1,024	1,392	916	14,693	
2018	6,071	4,500	2,072				1,103	1,555	924	16,225	
2019	6,047	4,454	2,288				1,104	1,556	855	16,304	
2020	5,577	4,615	2,419				1,219	1,592	707	16,129	

その他(累積漁獲量順) : フェロー諸島、西ドイツ、仏領サンピエール島・ミクロン島、ノルウェーほか