

日本海の漁業資源（総説）

日本海は太平洋の縁海であり、隣接する海とは対馬、津軽、宗谷及び間宮の 4 海峡で接続している。これらの海峡はいずれも水深 50～140 m 程度と比較的浅くて狭い。日本海の表面積は 105.9 万 km²、全容積は 168.2 万 km³ である。最深部の水深は 3,700 m を超え、平均深度は 1,588 m で広さの割にはかなり深い海である。

隣接する海から日本海に流入する海水は、対馬海峡を通じて流入する対馬暖流が殆どであり、津軽、宗谷及び間宮海峡から流入する海水は微々たるものであると言われている。隣接する海と接続する海峡の水深が浅いために海水交換は表層に限られ、流入する暖流水は表層に薄く分布し、その下層の約 300 m 以深には海域内で生成された日本海固有水と呼ばれる水温 0～1℃・塩分 34.1 程度のほぼ均質な海水が全容積の 85% を占める形で分布している。

海底地形は南北両半域で著しく異なり、北半域の朝鮮半島北部及び沿海州に沿った水域では、狭くて単調な陸棚で縁取られ、陸棚に続く海底地形も概して変化に乏しい。これに対して南半域の中央部から本州にかけては、多数の堆、礁、島々が分布し、起伏に富んだ複雑な地形をしている。この地形的な特徴は底魚漁場としての意義だけでなく、表層の海況や漁況にも重要な影響を及ぼしている。また、沿岸漁場として有用な 200 m より浅い陸棚の面積は 27.2 万 km² で、日本海全体の約 4 分の 1 を占めている（図 1）。（以上、長沼（2000）、気象庁ウェブページから引用）

日本海の漁業資源と漁業

地形的な特徴と制約を受けて日本海の生物相は成立しているが、その生物相は種数の面から貧弱であると言われている。魚類について見ると、日本海に分布する種数は全体で 500 種余であるが、西部の山陰沿岸海域で多く、北部で少ない傾向がある。

日本海的主要な漁獲対象魚種は、マイワシ、マサバ、マアジ、ブリ、スルメイカ等の浮魚類、ヒラメ、マダイ、カレイ類、ス

ケトウダラ、マダラ、ハタハタ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ホッコクアカエビ等の底魚類が挙げられる。日本海の生物群集構造は、水深 200 m をおよその境界として、浅海域の「おか場」と深海域の「たら場」に区分され、それぞれに生息する魚種が特徴付けられる。すなわち、「おか場」には対馬暖流の影響下にある種類が、「たら場」には日本海固有水の影響下にあ




図 1. 日本海の概要（長沼 1992）

表 1. 新潟県沖合水域における底生生物群集構造（尾形 1980）

太字下線は各区分を特徴づける生物

区分	おか場-I	おか場-II	おか場-III	おか場-IV	たら場-I	たら場-II	たら場-III
水深帯 (m)	0～20	20～70	70～140	140～190	190～300	300～600	600～
代表的生物	ハタハタ (稚) マダイ (稚) チダイ (稚) ヒラメ (稚) シタビラメ類 クロダイ キス カワハギ メバル ヒメジ テンジクダイ ハオコゼ クルマエビ ガザミ シャコ	ハタハタ (幼) マダイ チダイ ヒラメ ムシガレイ マコガレイ タマガンゾウビラメ アカムツ アラ アンコウ キンカジカ ヒメ ジンドウイカ ヒラツメガニ エビジャコ	ハタハタ (幼) ヒラメ ニギス (幼) マガレイ ムシガレイ ヤナギムシガレイ アイナメ カナガシラ ソコカナガシラ ツマグロカジカ ギンボ エンコウガニ	ハタハタ (幼) アブラツノサメ ニギス ヒレグロ ソウハチ ホッケ ウスメバル キュウリエソ ヒキガニ ホタルイカ クモヒトデ類	ハタハタ スケトウダラ マダラ ヒレグロ アカガレイ ハツメ ウスメバル ズワイガニ トヤマエビ ミズダコ クモヒトデ類	スケトウダラ ノロゲンゲ アゴゲンゲ アカガレイ ドスイカ ホッコクアカエビ ツバイ ズワイガニ クモヒトデ類	ベニズワイ セツパリカジカ ドブカスベ コンニャクウオ類




図2. 日本海の日韓暫定水域
鳥取県農林水産部ウェブページより引用

る種類が分布している（表1）。日本海には、1999年に発効した日韓漁業協定において定められた「日韓暫定水域」が設定されている（図2）。

日本海の浮魚類主要種の生物学的特徴と資源動向

【マイワシ】

日本海で漁獲対象となっているマイワシは対馬暖流系群であり、九州鹿児島から北海道日本海側の沿岸から沖合にかけて



図3. マイワシの分布（対馬暖流系群）

分布する（図3）。産卵場は九州西岸から能登半島にかけての沿岸域に形成されるが、1980年代の資源の高水準期には九州北部や韓国南方の沖等、西方や北方に広がって形成されていた。産卵期は1～6月、寿命は7歳程度である。成熟開始年齢は環境や資源水準により変化することが知られており、2021年時点では1歳の25%、2歳の100%が成熟すると推定されている。

本系群は、日本海を含む対馬暖流域において我が国と韓国に漁獲されている。我が国の漁獲量は、1983年に100万トンを超え、1991年まで100万トン以上であったが、その後急速に減少し、2001年には1千トンまで落ち込んだ（図4）。その後、2004年以降は増加傾向となり、2013年の漁獲量は8.5万トンと2000年以後で最も多かった。2014年は漁獲量が急減し9千トンとなったが、その後は増加し、2015～2018年の




図4. マイワシの漁獲量（対馬暖流系群、1953～2021年）

漁獲量は5.4万～7.1万トン推移した。2019年の漁獲量は1.4万トンまで再び減少したが、2020年は7.3万トンと増加した。2021年の漁獲量は5.5万トンであり、日本海北部（青森県～石川県）と日本海西部（福井県～山口県）では前年並みであったが、東シナ海（福岡県～鹿児島県）では前年の2割程度に減少した。

本系群の資源量は、1988年に1,000万トンを超えたが、1990年代に急減した。2004年以降資源量は増加し、2010年に10万トンを超えた後、2019年まで20万トン前後で推移した。2020年より増加傾向にあり、2021年には54.1万トンと推定された。2021年の漁獲圧の水準は最大持続生産量（MSY）を実現する水準を下回ると判断され、親魚量の水準はMSYを実現する水準を下回り、親魚量の動向は増加と判断されている。

【マアジ】

日本海で漁獲対象となっているマアジは対馬暖流系群であり、東シナ海南部から九州、山陰、日本海の北部に至る沿岸に広く分布する（図5）。産卵期は1～6月で、南の海域ほど早く、盛期は3～5月である。主な産卵場は東シナ海にあるが、日本海にも形成される。寿命は5歳前後で、1歳で半数の個体が成熟を開始し、2歳でほぼ全ての個体が成熟する。

本系群は我が国と韓国、中国に漁獲されている。対馬暖流域での我が国のマアジ漁獲量は、1973～1976年には9.3万～15



図5. マアジの分布（対馬暖流系群）




図6. マアジの漁獲量（対馬暖流系群、1973～2021年）

万トンであったが、その後減少し、1980年に4.1万トンまで落ち込んだ（図6）。1980～1990年代は増加傾向を示し、1993～1998年には20万トンを超えたが、1999～2002年は13.5万～15.9万トンに減少した。2003年から漁獲量は再び増加し、2004年には19.2万トンであった。その後次第に減少し、2018年以降は10万トンを下回った。韓国は毎年、数万トンを漁獲しており、2019年以降増加傾向で、2021年のアジ類の漁獲量は5万トンであった。中国のマアジ漁獲量は2003年以降に報告されるようになった。2005～2007年には10万トンを超えたが、2008年には5.9万トンに減少し、2009年以降は2万～4万トンの間で推移しており、2020年は3.9万トンであった。

本系群の資源量は、1973～1976年の25万～34万トンから1977～1980年の13万～18万トンに減少した。その後、増加傾向を示し、1993～1998年には50万～54万トンの高い水準を維持した。1999年以降はそれよりやや低く、2001年に28万トンまで減少したが、その後増加して、2004年は54万トンとなった。2005年から2012年にかけてゆるやかに減少し、2012年は34万トンだった。2013～2020年は35万～42万トンで推移し、2021年は39万トンであった。2021年の漁獲圧の水準はMSYを実現する水準を下回っていると判断され、親魚量の水準はMSYを実現する水準を上回り、親魚量の動向は増加と判断されている。

【ブリ】

日本海では、九州から北海道に至る沿岸各地に來遊するブリが漁獲対象となっている。ブリの産卵期は1～7月であり、東シナ海の陸棚縁辺部を中心に、九州から能登半島周辺以西及び伊豆諸島以西の沿岸各海域で産卵する（図7）。寿命は7歳前後である。2歳で半数の個体が成熟を開始し、3歳で全ての個体が成熟する。

本種は我が国と韓国に漁獲されている。ブリに関する農林統計は1952年以降、ブリ類（ブリの他、ヒラマサ、カンバチ類を含む）として集計されており、日本全体では、1950～1970年代中盤には3.8万～5.5万トン、1970年代終盤～1980年代



図7. ブリの分布




図 8. ブリの漁獲量（1994～2021 年）

には漸減して 2.7 万～4.5 万トン、1990 年代には増加して 4.3 万～6.2 万トン、2000 年代にはさらに増加して 5.1 万～7.8 万トンとなった（図 8）。2014 年には過去最高の 12.5 万トンとなり、2021 年で 9.4 万トンであった。韓国のブリ類の漁獲量は 2008 年から大きく増加し、2021 年まで 0.9 万～1.9 万トンで推移した。2021 年の韓国の漁獲量は 1.5 万トンであった。

本種の資源量は、2017 年に 37.2 万トンと最大となったが、2018 年以降の資源量は減少傾向にあり、2021 年の資源量は 29.9 万トンであった。2021 年の漁獲圧の水準は MSY を実現する水準を上回っていると判断され、親魚量の水準は MSY を実現する水準を下回り、親魚量の動向は減少と判断されている。

【スルメイカ】

スルメイカは、日本の周辺に広く分布し、産卵期の違いにより秋季発生系群と冬季発生系群とに分けて評価している。日本海で主に漁獲対象となっているのは秋季発生系群であり、夏～秋季の漁獲が多い。秋季発生系群の産卵場は、北陸沿岸から山陰、東シナ海にかけての海域である（図 9）。産卵期は 10～12 月で、産卵場から成長しながら日本海を北上する。寿命は約 1 年である。なお、冬季（12～3 月）には、東シナ海に産卵場を形成する冬季発生系群の漁獲が主体となる。

秋季発生系群は、我が国のほか、韓国、中国、北朝鮮及びロシアに漁獲されている。我が国では主にいか釣りや漁獲され、漁獲量は、1980 年代は平均 15.7 万トンであったが、韓国の漁獲量の急速な増加により 1996 年漁期及び 1999 年漁期には 30 万トンを超え、1970 年代前半の日本海の漁獲量と同程度まで増加した（図 10）。以降、日韓合計の漁獲量は 2000 年前後をピークとして減少したが、2005 年漁期以降に中国漁船による漁獲が本格化し、2005 及び 2006 年漁期で 38 万トン前後のピークとなり、以降は減少傾向で、2020 年漁期で 20.4 万トン、2021 年漁期で 9.6 万トンであった。

冬季発生系群は、我が国では主に太平洋側で漁獲されており、2021 年漁期（4 月～翌年 3 月）の漁獲量は 2.5 万トンであった。2012 年漁期以降の中国の漁獲量は 2013 年漁期に最も多く 2.7 千トンであり、2021 年漁期は 455 トンであった。同じく 2012 年漁期以降のロシアによる漁獲量は 277～1.8 万トンの範囲で推移し、2021 年漁期は 0.5 万トンと報告されている。2021 年漁期における我が国による漁獲量は 1.4 万トン（前年




図 9. スルメイカの分布（秋季発生系群）




図 10. スルメイカの漁獲量（秋季発生系群、1979～2021 年）

比 52%) で、韓国による漁獲量は 0.6 万トン（前年比 35%）であった。

秋季発生系群の資源量は、1980 年代の低い水準から 1990 年代に増加し、1990 年代後半から 2010 年代前半にかけて高い水準で推移した。2016～2019 年漁期は低加入の年が続く資源量が減少した。2020 年漁期に資源量は増加したものの、2021 年漁期以降再び減少し、2022 年漁期の資源量は 28.1 万トンと推定された。近年の漁獲圧の水準は MSY を実現する水準を下回っていると判断され、親魚量の水準は MSY を実現する水準を下回り、親魚量の動向は横ばいと判断されている。

冬季発生系群の資源量は、1990 年漁期以降は、本系群の再生産に好適な環境下であり、短期的な変動はあるものの、概ね 50 万～100 万トンの範囲で安定して推移していたが、2015 年、2016 年漁期に連続して産卵場の水温環境が不適であったことを主な要因として大きく減少し、それ以降は横ばい傾向にある。2022 年漁期の資源量は 14.1 万トンで前年よりやや増加した。2021 年漁期の漁獲圧の水準は MSY を実現する水準を下回っていると判断され、親魚量の水準は MSY を実現する水準を下回り、親魚量の動向は横ばいと判断されている。

日本海の底魚類主要種の生物学的特徴と資源動向

日本海の底魚資源を対象にした漁業は、底びき網、船びき網、刺網、はえ縄、一本釣り、かご網、定置網等の多種類にわたっているが、中でも底びき網が基幹漁業である。底びき網は、沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業に区分される。底びき網の漁獲物の主要なものは、スケトウダラ、ホッケ、ハタハタ、アカガレイ、ソウハチ、ムシガレイ、ニギス、ズワイガニ、ホッコクアカエビ等である。

【ズワイガニ】

ズワイガニ日本海系群は、本州沿岸から朝鮮半島東岸の大陸棚斜面（水深200～500m）に分布する（図11）。初産雌は夏から秋、経産雌は2～3月に産卵抱卵し、初産雌の卵は1年半余り後、経産雌の卵は1年後の2～3月に孵化する。寿命は10歳以上であり、成熟開始年齢は脱皮齢期で雌雄とも11歳であり、ふ化から7～8年と考えられている。

本系群は我が国と韓国に漁獲されている。我が国では主に底びき網により漁獲され、かご網、刺網でも漁獲される。漁獲量は、1950～1970年代初めは1万トン前後から1.5万トンに達したが、1970年代後半には5千トン程度に減少し、1980年代は2千～5千トンで推移した（図12）。1990年代初めには2



図11. ズワイガニの分布（日本海系群）




図12. ズワイガニの漁獲量（日本海系群、1954～2021年）

千トン以下に減少したが、その後増加して2000年代は4千～5千トンで推移し、2007年には5.2千トンに達した。2010年代はやや減少しており、2021年は2.2千トンであった。日韓暫定水域の漁獲を含む韓国の漁獲量は2007年をピークに減少し、2021年は2.0千トンであった。

富山県以西（A海域）では、資源量は2000年代初めの1.3万トン前後から、2003年以降増加し、2007年には3.0万トンに達した。以後はやや減少して2万トン前後で推移し、2021年は1.4万トンであった。2022年はやや回復し、1.5万トンであった。近年の漁獲圧の水準はMSYを実現する水準を下回っていると判断され、親魚量の水準はMSYを実現する水準を下回り、親魚量の動向は減少と判断されている。

新潟県以北（B海域）では、資源密度指数は、1992年に最低であったが1990年代中頃に上昇して2013年に最高となって以降は低下していたが、2020年から再び上昇傾向にある。また、親魚量は増加傾向にあると判断されている。

【ベニズワイガニ】

ベニズワイガニ日本海系群は、日本海の沖合域の水深500～2,700mに広く分布する（図13）。主産卵期は2～4月であり、隔年産卵で抱卵期間は約2年である。寿命は10年以上である。

本系群は我が国と韓国に主にかご網により漁獲されている。我が国EEZ内の漁獲量は、1980年代には40,000トンを超えていたがその後減少し、2003年には最低の12,055トンとなった（図14）。その後2007年には16,902トンまで増加したが、以後2020年まで減少傾向が続き、2021年は増加に転じて11,179トンであった。日韓北部暫定水域内の漁場を利用して韓国の漁獲量も同様に減少傾向にあったが、2021年は増加に転じた。

【ホッコクアカエビ】

ホッコクアカエビ日本海系群は、北海道から鳥取県の沿岸の水深200～600mに分布し、底びき網、かご網で漁獲される（図15）。日本海中央部の大和堆にも分布し、底びき網で漁




図13. ベニズワイガニの漁場（日本海系群）




図 14. ベニズワイガニの漁獲量（日本海系群、1980～2021 年）

獲される。産卵期は2～4月であり、雄性先熟の雌雄同体で雄から雌に性転換し、雌の成熟は6歳とされる。寿命は11歳と推測される。

本系群の我が国の漁獲量は1982年の4,155トンをピークに減少し、1991年に1,404トンと最低となった。近年は増減を伴いながら緩やかに増加しており、2021年は2,604トンであった（図16）。2021年の資源水準は高位、動向は増加と判断された。



図 15. ホッコクアカエビの分布（日本海系群）




図 16. ホッコクアカエビの漁獲量（1980～2021 年）

【アカガレイ】

アカガレイ日本海系群は、隠岐東方、若狭湾及び加賀沖を主とする、島根県から青森県の沿岸の水深150～900mに分布する（図17）。産卵場は若狭湾、経ヶ岬周辺、赤崎沖を中心とする隠岐諸島周辺及び粟島北方に形成される。産卵期は2～4月であり、6～7歳程度の雌は25cm、雄は17cmで半数が成熟する。寿命はおおよそ雌20歳、雄15歳と考えられる。

本系群は主に底びき網により漁獲される。我が国の漁獲量は、1990年代以降では、1992年の2,281トンを最低とし、その後増加して2007～2010年は5,500トン前後で推移し、2011年は増加して近年最多の6,158トンとなった（図18）。その後はやや減少しており、2021年は3,616トンであった。

【ハタハタ】

日本海に分布するハタハタは、秋田県の産卵場を中心として能登半島の東から津軽海峡にかけて分布する日本海北部系群と、能登半島以西、山陰から朝鮮半島東岸にかけて分布する日本海西部系群とに分けて評価している（図19）。日本海西部の我が国沿岸の分布域の多くは成育場となっており、大規模な産卵場はなく、日本海西部系群は朝鮮半島東岸生まれ群と秋田県沿岸生まれ群で主に構成されると考えられている。産卵期は



図 17. アカガレイの分布（日本海系群）




図 18. アカガレイの漁獲量（日本海系群、1991～2021 年）




図 19. ハタハタの分布（上：日本海北部系群、下：日本海西部系群）

主に 12 月、寿命はおおよそ 5 歳であり、成熟は、雄は 1 歳、雌は 2 歳から始まる。

日本海北部系群は、冬季の産卵・接岸時には定置網、底建網、刺網により、それ以外の時期には底びき網により我が国で漁獲される。漁獲量は、2 万トン程度あった 1970 年代前半から 1980 年代にかけて急激に減少し、1991～1994 年は 200 トン未満となった（図 20）。1995 年から徐々に増加し、2004 年には 5,405 トンに達したが、その後は減少し、2021 年には 683 トンであった。2021 年の資源水準は低位、動向は横ばいと判断された。

日本海西部系群は我が国の底びき網により漁獲される。漁獲量は、1970 年代から 1980 年代半ばには 8,000 トンを超える年もあったが、1980 年代後半に減少し、1990 年代は 5,000 トンを下回る年が多くなった（図 21）。1990 年代後半から増加し、2003 年に過去最高（9,475 トン）となった後、1～2 年ごとに増減を繰り返し、2009 年からは 3,500～6,000 トンで推移し、2021 年は 3,245 トンであった。2021 年の資源水準は高位、動向は横ばいと判断された。




図 20. ハタハタの漁獲量（日本海北部系群、1965～2021 年）




図 21. ハタハタの漁獲量（日本海西部系群、1965～2021 年）




図 22. 大和堆の地形（海洋水産資源開発センター 1989、1992）

大和堆の漁業資源

大和堆は日本海のほぼ中央に位置し、北緯 39 度 20 分、東経 135 度を中心として、全体的に東北東－西南西の方向に、長さ約 230 km、中央部の幅は約 55 km の長い紡錘状の形を呈している（図 22）。水深 400 m 付近から頂部に平坦面がみられ、最浅部は 246 m に達する。水深 1,000 m 以浅の地域の面積は約 7,900 km² である（海洋水産資源開発センター 1992）。

大和堆では、いか釣り漁業によるスルメイカ、かご漁業によるベニズワイガニ及び沖合底びき網漁業によるホッコクアカエビの漁獲が多い。この海域では、ズワイガニは全面的に禁漁とされている。

大和堆におけるホッコクアカエビの漁獲は、我が国の底びき網によりを中心に行われている。1996～2003 年での大和堆に




図 23. 大和堆におけるホッコクアカエビの沖合底びき網による漁獲量（1980～2021 年）

におけるホッコクアカエビの推定資源量はほぼ横ばいであった。近年は本州沿岸でホッコクアカエビが好漁であるために、2001 年以降大和堆への出漁が減少し、その結果、大和堆での漁獲量は低い水準にとどまっており 2021 年は 92 トンであった（図 23）。

執筆者

東アジアユニット

水産資源研究所 水産資源研究センター 底魚資源部

服部 努

参考文献

- 海洋水産資源開発センター. 1989. 昭和 63 年度沖合漁場総合整備開発基礎調査日本海大和堆海域報告書（本文編）. 海洋水産資源開発センター, 東京. 269 pp.
- 海洋水産資源開発センター. 1992. 平成 3 年度沖合漁場総合整備開発基礎調査報告書（総括編）日本海大和堆海域. 125 pp.
- 気象庁. https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/mar_env/knowledge/koyusui/koyusui.html (2022 年 11 月 30 日)
- 長沼光亮. 1992. 日本海の成り立ちと海況. *in* 新潟大学放送公開講座実行委員会（編）, 新潟の生物誌-海から山まで. 新潟大学放送公開講座実行委員会, 新潟. 1-13 pp.
- 長沼光亮. 2000. 生物の生息環境としての日本海. 日本海区水産研究所研究報告, 50: 1-42.
- 尾形哲男. 1980. 日本海海域底魚資源. *in* 青山恒雄（編）, 底魚資源. 恒星社厚生閣, 東京. 229-244 pp.
- 鳥取県農林水産部. <http://www.pref.tottori.lg.jp/44943.htm> (2022 年 11 月 30 日)