

東シナ海・黄海の漁業資源（総説）

東シナ海・黄海は大陸河川によって供給される豊かな栄養塩を基礎として、黒潮系水と大陸沿岸系水との顕著な潮目の形成も加わり、生産性が極めて高い海域とされている。また、広大な浅い砂泥域が広がっていることから、同緯度の他の海域から比べてニベ科魚類、ウシノシタ科魚類、マナヅオ科魚類、カタクチイワシ科魚類等が種数・分布量ともに卓越している。更に、黄海域には黄海中央底層冷水が周年存在することから、マダラ、ニシン、ソウハチといった冷水性の魚類も分布する。こういった多様な魚類相と高い生産性を背景として、当海域に存在する漁業資源について我が国をはじめ中国、韓国等が利用しており、東シナ海・黄海は典型的な国際入会（いりあい）漁場となっている（図1）。国際連合食糧農業機関（FAO）統計で東シナ海・黄海域を含む海域区分（北西太平洋）における日本、中国及び韓国の国別漁獲量をみると、日本の漁獲量は1980年代の我が国周辺でのマイワシ漁獲量の増大でピークを迎えた後、2000年代にかけて減少している一方、中国の漁獲量は1980年代後半以降大きく増大しているが、近年ではやや減少に転じている（図2）。各国の漁業の変化の詳細は以下の通りである。

韓国の東シナ海・黄海からの漁業生産は1950年代の20万トン台から1980年代には190万トン台に増えた。しかし、このような生産増大も1990年代後半から減少に転じ、2010年代後半以降は約100万トンの水準で推移している（図2）。

一方、中国の漁業は、1950～1960年代は沿岸を中心とした定置網（張網）と刺網が主な操業形態であったが、1960年代末から2そうびき底びき網漁業が海面漁業の操業形態の主体となっていった。それに伴い漁獲量もしばらくの間は増加を見せていたが、1970年代後半から減少傾向に転じ、その後底びき網の漁船数を減らす等の措置がとられた。しかし、1980年代からの国策転換に伴い、1985年に漁業の全面開放が行われ、漁船数と馬力数の増加は再び勢いを増し、中国の海面漁獲量の増加をもたらした。FAO統計における中国の統計値は改善が必要とされているが（FAO 2020）、1990年代以降の中国の漁獲量の増大は著しく、1996年から2018年まで1,200万トンを越える高水準で推移した。しかし、近年はやや減少している（図2）。

東シナ海・黄海における日本の代表的な漁業としては、歴史的に大中型まき網漁業と以西底びき網漁業が挙げられる。大中型まき網漁業は、サバ類・マアジを主対象とする西日本最大の漁業であり、基本的な漁場は隠岐諸島から尖閣諸島付近までの陸棚縁辺域と済州島西部海域である。このうち、済州島西部海域は主にマサバの漁場であったが、2016年以降、入漁条件が合意されず日本船による操業はない。大中型まき網漁業の総漁獲量の変化を長期的に見ると、変化の大きな要因はマイワシ資源の消長ではあるが、1990年代以降の漁獲努力量の減少も相まって総漁獲量は大きく減少し、2000年代に入ってからほぼ横ばいで推移した（図3）。2010年代、一部の漁船が冬季に太平洋側に出漁することで漁獲量は再びやや減少傾向にあっ




図1. 東シナ海周辺における漁業関係模式図

たが、2020年代に入り、サバ類やマイワシの漁獲が増え、総漁獲量はやや回復傾向にある。

一方、かつて東シナ海・黄海全域を利用していた以西底びき網漁業は、資源状態の悪化、各国漁業との漁場の競合や輸入水産物の増加といった要因により衰退し、現在では主に九州西岸沖の我が国排他的経済水域（EEZ）内を中心とする東シナ海陸棚縁辺部で操業する漁業に変化している。以西底びき網漁業は1960年代に30万トン台、1975年までは20万トン台の漁獲量を維持していたが、その後は一貫して減少傾向が続き、1988年には10万トンを割り込み、2000年以降は更に減少して1万トンを割り込むようになった（図3）。漁獲量の減少とともに、当漁業が漁獲する魚種も年代によって大きく変わってきた。最盛期の1960年には、漁獲量上位5魚種はキグチ、タチウオ、ハモ、シログチ及びエソ類であり、すり身原料となる魚種が主体で、その漁獲量は18万トンで全体の54%を占めていた。しかし、現在はキダイやイボダイ等、我が国に近い大陸棚縁辺部の漁場に分布する魚種の割合が増加している。このように本海域では、かつては日本の漁獲量が最も多かったが、韓国や中国の漁業の発展に伴い、日本の漁獲量は他国に比べて少なくなっている。

このような日本、中国及び韓国による長期間の継続的で強い漁獲圧により、当海域の漁獲対象種の生物学的・生態学的特性には様々な変化が認められるようになった（堀川・山田 1999、小西ほか 2001、密ほか 2001）。多くの魚種で資源状況の悪化が認められているだけでなく、更に分布域の縮小、漁獲物

の小型化、成熟に達する体サイズの小型化、早熟化等が認められる魚種もみられる。

今まで日本では、以西底びき網漁業をはじめとする大規模漁業から東シナ海・黄海に関する多くの科学的情報を得てきたが、近年、東シナ海陸棚縁辺部だけで操業するようになった以西底びき網漁業等の情報のみでは東シナ海・黄海全域の資源を評価することは困難になった。そのため、調査船による資源調査の重要性が以前にも増して高まってきている。日中間では2002年より日中漁業共同委員会の下に日中海洋生物資源専門家小委員会が、日韓間では2004年より日韓漁業共同委員会の下に日韓海洋生物資源専門家小委員会が設置された。このような国際的枠組みを通じて、東シナ海・黄海での漁業資源の状況を可能な限り正確に把握し、それらを適切に管理するために、沿岸国の協力の下、共同研究・共同調査を実施する体制を早急に整備しなければならない。

しかし、これまでに開催された日中海洋生物資源専門家小委員会では、タチウオ、サバ類等について資源状況に関する情報交換がなされてきたものの、中国側からは我が国における資源解析に利用できるような詳細な資料の提供はなされていない。2017年4月に開催された第15回日中海洋生物資源専門家小委員会において、マサバの共同資源調査を進めることが合意されたことは一定の前進と考えられるが、2018年5月に第16回日中海洋生物資源専門家小委員会が開催されて以降、動きはな




図2. FAO統計（北西太平洋区分）における日本、中国及び韓国の総漁獲量（1981～2023年、中国は2022年まで）




図3. 以西底びき網漁業及び大中型まき網漁業の漁獲量の推移（1973～2023年）


い。また、2017年6月以降、日中のEEZ内における相手国側での操業は行われていない。

日韓海洋生物資源専門家小委員会においても、魚種別漁獲割当に関連したマアジ、マサバ、スルメイカ等の資源状態について情報提供が行われているが、日韓双方は、それぞれの評価単位や分析方法により資源状態を評価しているため、議論がかみ合わない部分がある。分析方法の統一等を行い、より有意義な資源議論を行うことが今後の課題となっている。なお、2016年7月以降、日韓のEEZ内における相手国側での操業は行われておらず、日韓海洋生物資源専門委員会も開催されていない。

以下に、当海域の重要な国際資源であるタチウオ、マサバ、ゴマサバの資源状態などについてまとめた。

タチウオ

(Largehead Hairtail *Trichiurus japonicus*)



漁業の概要

タチウオはかつて以西底びき網漁業の主要漁獲物であり、1980年代中盤までは我が国のタチウオ漁獲量のおよそ7～8割を同漁業が占めていた。以西底びき網漁業による本種の漁獲量は1967年には5万トン以上を記録したが、その後急減し1996年には1,000トンを下回り、2002年以降は50トン未満で推移している。日本海西部海域における沖合底びき漁業による漁獲量も1983年の594トンから著しく減少し、2005年以降はおおむね100トン未満で推移している。1995年以降は大中型まき網漁業による漁獲が以西底びき網漁業を上回るようになったが、2007年の1,132トンを除いて、2002年以降の漁獲量は1,000トンを下回って推移している。タチウオに対する近年の我が国の主な漁業は、まき網、ひき縄及び釣りである。我が国の総漁獲量は近年2,000トン前後で推移しており、2022年には2,001トン、2023年は減少して1,363トンであった（図4-1）。

韓国は、日韓暫定水域を除く我が国EEZにおいて、我が国に匹敵する漁獲をしていたが、2016年7月以降、日本EEZ内での韓国漁船の操業は行われていない。韓国のタチウオの漁獲量は、1983年の約15万トンから減少し、1996年から2009年まではおよそ6万～9万トンで推移し、その後2012年に約3.3万トンまで減少した。近年は3万～5万トン程度で推移し、2023年は約6.1万トンであった（図4-2）。

一方、中国は、1995年以降、ほぼ毎年100万トン以上のタチウオを漁獲していたが、近年はやや減少傾向にあり2022年




図4-1. 我が国のタチウオ日本海・東シナ海系群の漁獲量 (1981~2023年)




図5. タチウオの成長 (W型:春生まれ群、N型:秋生まれ群)




図4-2. 韓国のタチウオ漁獲量 (1981~2023年)



図6. タチウオ日本海・東シナ海系群の分布

は90万トンであった。うち東シナ海で漁獲したものは60万~70万トンと推定される。本種の系群については、かつて冬季に済州島西部で越冬する黄・渤海系群と、バーレンから温州湾沿岸で産卵し、東シナ海中・南部で越冬する東シナ海系群に分けるのが妥当であるとされてきたが(密ほか2001)、近年の卵稚仔調査結果等から東シナ海、黄・渤海から対馬暖流域に至る個体群を一つの集団とし、日本海・東シナ海系群として取り扱うことが妥当と考えられる。したがって系群全体で見ると、主に中国が漁獲しているといえる。

生物学的特性

本系群の成長を図5に示す。タチウオの耳石には、春生まれとされる第1輪の輪径が大きいW型和秋生まれとされる第1輪の小さいN型が存在する。寿命は約8歳であり、成熟は1歳の一部で始まり、3歳には全ての個体が成熟に達する(図5)。主な産卵場は中国沿岸域であるが、日本の沿岸域でも産卵する。産卵期は長く春から秋に及び、盛期は春と秋に分かれる。東シナ海での越冬場は東シナ海中・南部だが、日本海沿岸にも分布する(図6)。主な餌生物は、小型個体ではアミ、オキアミ等の小型甲殻類であるが、大型個体(肛門前長250mm程度以上)は魚類を捕食する。

資源状態

以西底びき網漁業(2そうびき)及び沖合底びき網漁業(2そうびき)の漁獲量と網数、さらに1986年以降、東シナ海で

実施している着底トロール調査(東シナ海底魚資源分布生態調査および底魚類現存量調査(東シナ海))の1網あたりの漁獲量データをもとに、VASTモデル(Vector Autoregressive Spatio-Temporal model)により計算した資源量指数は低位で(図7-1)、また調査船調査による現存量推定値からも資源水準の回復は見られないことから(図7-2)、我が国EEZの資源水準は低位と判断される。この資源量指数及び調査船調査による現存量推定値から、動向は横ばいと判断される。

Xu *et al.* (2003) は、東シナ海と黄海南部の中国漁獲に対してコホート解析を行い、1995年の夏季休漁導入直後から親魚量当たり加入量は増加したものの、漁獲努力量が大きいため漁獲物の若齢化・小型化が見られる等、資源は不安定であることを示し、資源回復のためには漁獲強度を減じ、高齢魚の比率を増加させる必要があるとした。また、Ling *et al.* (2008) も東シナ海のタチウオの資源利用状況について解析し、漁獲物がほとんど0~1歳で占められる現状においては、漁獲圧を下げつつ漁獲開始年齢を引き上げることが資源の持続的利用に有効としている。Park *et al.* (2001) は、韓国海域のタチウオ資源には高い漁獲圧がかかっており、資源量は1980年代初期の約30万トンから1997年の10万トン以下まで減少しているとした。




図 7-1. 以西底びき網 (2 そうびき) によるタチウオの資源量指数 (1959~2023 年、VAST モデル)




図 7-2. 調査船トロール調査に基づく東シナ海タチウオの現存量推定値 (1998~2024 年、バーは 95%信頼区間)

我が国においては現在、タチウオを主対象とする大規模な漁業は行われておらず、主として周辺国による高い漁獲圧により資源状態が悪化してきたものと判断される。

管理方策

近年、日中韓三国の漁獲量は合計 110 万~150 万トンで推移しているが、本系群全体については資源水準・動向の指標値が存在しないため、現在の資源水準について関係国間で見解が一致していない。このため包括的な資源管理方策が行われていないのが現状であり、早急に関係国が共有可能な客観的手法による資源判断基準を作る必要がある。また、資源回復に向けて、関係各国との連携により東シナ海全域での漁獲圧を削減することが不可欠である。近年、中国においても浙江省を中心にタチウオを主対象とした漁獲圧削減の取り組みが行われるようになった。また、我が国 EEZ における資源は長期にわたり低位水準にある。漁獲圧をより下げることで、我が国周辺海域に來遊した資源を適切に利用し、かつ我が国周辺海域で再生産を行う親魚を保護することが重要である。

マサバ (Chub Mackerel *Scomber japonicus*)



漁業の概要

当該海域で漁獲されるマサバは対馬暖流系群に属する。東シナ海及び日本海における我が国のマサバ漁獲の大部分はまき網漁業によるもので、近年では同海域で操業する大中型まき網漁業の漁獲量の 2~3 割を本種が占める。主漁場は東シナ海から九州北西岸及び日本海西部である (図 8)。それまでの大中型まき網漁業の漁場 (海区制) 内の許可隻数の制限に加え、1997 年から、ゴマサバとあわせてサバ類について総漁獲可能量 (TAC) による資源管理が実施されている。

我が国の漁獲量は、1970 年代後半は約 30 万トンであったが、1990~1992 年は約 14 万トンに減少した (図 9)。1993 年以降、増加傾向を示し、1996 年には約 41 万トンに達したが、再び減少し、2000~2006 年は 9 万トン前後で推移した。2007 年以降は増減を繰り返し、2013 年には約 6.5 万トンと 1973 年以降で最も低い値となったがその後増加に転じ 2018 年は約 14.4 万トンであった。その後、やや減少し、2023 年は約 10.2 万トンであった。近年大中型まき網の一部が太平洋側で操業するなど、東シナ海での漁獲努力量は減少傾向にある。なお、韓国内の済州島西側海域はマサバ漁場として我が国漁船によっても利用されてきたが、2016 年 7 月以降、韓国 EEZ 内




図 8. マサバ対馬暖流系群の分布




図9. マサバ対馬暖流系群の漁獲量(1973~2023年)

での我が国漁船の操業は行われていない。

韓国は、マサバを2008年に約19万トン、2009年に約17万トン漁獲したが、それ以降は2010年を除き10万トン前半で推移している。2023年の漁獲量は約12.0万トンであった(図9)。

一方、中国漁業統計年鑑によれば、中国の東シナ海及び黄海でのサバ類漁獲量は2010年以降30万トン前後であったが、2017年からやや減少し、2023年は24万トンであった。ただし、中国におけるマサバとゴマサバの魚種別の漁獲量は不明である。2010年代以降、東シナ海で操業する中国漁船の形態が虎網(注:付属船の集魚灯で魚群を集め、「虎網」と呼ばれる袋状の漁網を備えた漁船が魚群を取り囲み、船尾より網上げを行う効率的な操業)中心へと変化した。中国政府は虎網漁船の削減の方針を打ち出しているものの、依然としてマサバへの漁獲圧は高いと推定されるため、サバ類等の資源に及ぼしている影響への懸念が強まっている。

生物学的特性

寿命は約6歳であり、1歳で尾叉長25~28cm、5歳で約37cmに達する(図10)。1歳で60%、2歳で85%、3歳で100%の個体が成熟する。産卵は春季(盛期3~5月)に行われ、東シナ海南部の中国沿岸から東シナ海中部、朝鮮半島沿岸、九州・山陰沿岸の広い海域で行われる。春夏に索餌のために北上回遊を行い、秋冬に越冬・産卵のために南下回遊をする。オキアミ




図10. マサバの成長

類、アミ類、カイアシ類等の浮遊生甲殻類と小型魚類を摂餌する。

資源状態

資源計算は、日本と韓国の漁獲情報に基づいて行われている。資源量は1973~1989年には100万トン前後で比較的安定していたが、2000年以降は50万トン前後に減少した(図11)。しかし2014年以降の高加入により資源量は増加し、2017年には約62.7万トンに回復した。その後、再び減少したものの、2020年以降回復傾向にあり、2023年は約71.4万トンであった。漁獲割合は1995年以降概ね40~50%と比較的高い水準で推移したが、2014年と2017年にやや低下した。2020年以降も低く、2023年は約31%であった(図11)。親魚量は1997年以降低い値が続いていたが、近年では2021年以降、増加傾向にあり、2023年は28万トンだった。

管理方策

我が国では目標管理基準値(最大持続生産量(MSY)が基本)を定め、限界管理基準値と禁漁水準を設定したうえで、目標管理基準値への回復を図る方策を策定している。令和2年に定められた目標管理基準値は親魚量で31.0万トンとされており、2030年までにこれを達成するための管理方策が決められている。





図11. マサバ対馬暖流系群の資源量と漁獲割合(1973~2023年)

ゴマサバ
(Spotted Mackerel *Scomber australasicus*)



漁業の概要

東シナ海及び日本海の我が国のゴマサバ漁獲の大部分はまき網漁業によるものである。主漁場はマサバよりやや南方に分布し、東シナ海から九州南部沿岸域である(図12)。それまでの大中型まき網漁業の漁場(海区制)内の許可隻数の制限に加え、1997年からマサバとあわせてサバ類についてTACによる資源管理が実施されている。

東シナ海及び日本海における我が国のゴマサバ漁獲量は、年変動はあるものの、1980年代以降、およそ5万トン前後で推移していた(図13)。近年では2018年をピークに、2020年に約2.0万トンまで急減したが、2021年以降徐々に回復し、2023年は3.9万トンであった。韓国の漁獲量は日本に比べて変動が大きく、2014年に約2千トンであったゴマサバ漁獲量が2018年に過去最大の約7.4万トンとなった。その後、2020年には約5千トンに減少したが、再び増加し、2023年は約4.3万トンであった。中国のゴマサバ漁獲量は不明であるが東シナ海および黄海では2023年に24万トンのサバ類を漁獲した。このほか中国のサバ類漁獲については「マサバ」の項を参照されたい。




図12. ゴマサバ東シナ海系群の分布

生物学的特性

寿命は約6歳であり、成長は1歳で尾叉長約28cm、5歳で約39cmに達すると推測される(図14)。産卵は1~4月に東シナ海中部・南部から九州南部沿岸、5月に東シナ海中部から九州西岸で行われる。春夏に索餌のために北上回遊を行い、秋冬に越冬・産卵のために南下回遊をする。マサバよりやや南方域に分布するのが特徴である。幼魚はイワシ類の仔稚魚、浮遊性の甲殻類等、成魚は浮遊性甲殻類や小型魚類を捕食する。

資源状態

資源量の推定は、日本と韓国の漁獲情報に基づいて行われている。資源量は1992年以降、10万~20万トン程度で比較的安定していた(図15)。2008年には10万トンを下回ったが、その後増加傾向が続き、2018年には約22.3万トンまで増加した。その後、資源量は急減し、2020年は約9.1万トンと低い水準にあったが、2021年以降回復し、2023年は約18.2万トンであった。加入量は2009年以降2.5億尾前後で推移したが、2019年は1.3億尾、2020年は1.6億尾と少なかった。しかし、2022年には5.3億尾まで増加し、2023年は3.5億尾であった。親魚量は2012年以降2015年まで5万トン前後で横ばいであったが、2018年に10.2万トンまで増加した。その後、2020年に3.7万トンに急減したが、2023年は7.2万トンまで回復した。




図13. ゴマサバ東シナ海系群の漁獲量(1973~2023年)




図14. ゴマサバの成長




図 15. ゴマサバ東シナ海系群の資源量と漁獲割合 (1992~2023年)

管理方策

我が国では目標管理基準値 (MSY が基本) を定め、限界管理基準値と禁漁水準を設定したうえで、目標管理基準値への回復を図る方策を策定している。令和 2 年に定められた目標管理基準値が親魚量で 10.9 万トンとされており、2030 年までにこれを達成するための管理方策が決められている。

執筆者

東アジアユニット
水産資源研究所 水産資源研究センター
浮魚資源部
黒田 啓行

参考文献

FAO. 2020. The state of world fisheries and aquaculture 2020. 206 pp.
<https://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf> (2024 年 1 月 25 日)
堀川博史・山田梅芳. 1999. 東シナ海および黄海における底魚

類の生物特性の変化. 月刊海洋, 31: 631-636.

小西芳信・陳 衛忠・大下誠二・孟 田湘. 2001. キダイの生物・生態特性. In 堀川博史・鄭 元甲・孟 田湘 (編), 東シナ海・黄海主要資源の生物・生態特性—日中間の知見の比較. 西海区水産研究所, 長崎. 191-202 pp.

Ling, J.-Z., Li, S.-F., Yan, L.-P., and Cheng, J.-H. 2008. Utilization and management of *Trichiurus japonicus* resources in East Hingha Sea based on Beverton-Holt model. Chin. J. Appl. Ecol., 19: 178-182.

密 崇道・山田梅芳・兪 連福・堀川博史・時村宗春. 2001. タチウオの生物・生態特性. In 堀川博史・鄭 元甲・孟 田湘 (編), 東シナ海・黄海主要資源の生物・生態特性—日中間の知見の比較. 西海区水産研究所, 長崎. 165-190 pp.

Park, C.S., Lee, D.W., and Zhang, C.I. 2001. Population characteristics and biomass estimation of hairtail *Trichiurus lepturus* Linnaeus in Korean waters. Bull. Nat'l. Fish. Res. Dev. Inst. Korea, 59: 1-8.

Xu, H.-X., Liu, Z.-F., and Zhou, Y.-D. 2003. Study on the variation of hairtail (*Trichiurus haumela*) productivity and recruitment in the East China Sea, J. Fisher. China, 27: 322-327.